

表 2370 身長(cm) 性別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

性別	130未満	130～	135～	140～	145～	150～	155～	160～	165～	170～	175～	180～	185～	190～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	6	8	9	45	190	1,020	2,802	5,710	6,404	4,731	1,770	488	77	9	23,269	1,925	25,194	165.69	7.07
(%)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.2)	(0.8)	(4.4)	(12.0)	(24.5)	(27.5)	(20.3)	(7.6)	(2.1)	(0.3)	(0.0)	(100.0)				
女性	32	62	280	1,118	2,805	4,192	3,277	1,467	318	54	16	5			13,626	1,126	14,752	152.28	6.89
(%)	(0.2)	(0.5)	(2.1)	(8.2)	(20.6)	(30.8)	(24.0)	(10.8)	(2.3)	(0.4)	(0.1)	(0.0)			(100.0)				
合計	38	70	289	1,163	2,995	5,212	6,079	7,177	6,722	4,785	1,786	493	77	9	36,895	3,051	39,946	160.74	9.54
(%)	(0.1)	(0.2)	(0.8)	(3.2)	(8.1)	(14.1)	(16.5)	(19.5)	(18.2)	(13.0)	(4.8)	(1.3)	(0.2)	(0.0)	(100.0)				
記載なし																			
(%)																			
総計	38	70	289	1,163	2,995	5,212	6,079	7,177	6,722	4,785	1,786	493	77	9	36,895	3,051	39,946	160.74	9.54
(%)	(0.1)	(0.2)	(0.8)	(3.2)	(8.1)	(14.1)	(16.5)	(19.5)	(18.2)	(13.0)	(4.8)	(1.3)	(0.2)	(0.0)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査