

表 2371 身長(cm) 年齢(歳)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

年齢	130未満	130～	135～	140～	145～	150～	155～	160～	165～	170～	175～	180～	185～	190～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)									2 (100.0)						2 (100.0)		2	166.00	1.41
15歳～ (%)		2 (1.3)	3 (2.0)	6 (4.0)	10 (6.7)	22 (14.8)	23 (15.4)	15 (10.1)	18 (12.1)	32 (21.5)	12 (8.1)	4 (2.7)	2 (1.3)		149 (100.0)	13	162	161.64	11.66
30歳～ (%)	5 (0.2)	6 (0.3)	8 (0.3)	25 (1.1)	75 (3.3)	173 (7.5)	263 (11.5)	390 (17.0)	457 (19.9)	508 (22.1)	261 (11.4)	105 (4.6)	14 (0.6)	5 (0.2)	2,295 (100.0)	193	2,488	165.62	9.82
45歳～ (%)	4 (0.0)	4 (0.0)	19 (0.2)	70 (0.8)	291 (3.4)	835 (9.8)	1,237 (14.5)	1,509 (17.7)	1,752 (20.5)	1,740 (20.4)	790 (9.2)	251 (2.9)	43 (0.5)	3 (0.0)	8,548 (100.0)	625	9,173	164.58	8.92
60歳～ (%)	15 (0.1)	17 (0.1)	81 (0.5)	437 (2.5)	1,401 (8.0)	2,691 (15.3)	2,998 (17.0)	3,652 (20.7)	3,443 (19.5)	2,106 (12.0)	638 (3.6)	124 (0.7)	18 (0.1)	1 (0.0)	17,622 (100.0)	1,392	19,014	160.49	8.89
75歳～ (%)	12 (0.2)	34 (0.4)	162 (2.0)	571 (7.2)	1,166 (14.6)	1,434 (18.0)	1,498 (18.8)	1,573 (19.7)	1,027 (12.9)	396 (5.0)	85 (1.1)	9 (0.1)			7,967 (100.0)	787	8,754	156.12	8.91
90歳～ (%)	2 (0.6)	7 (2.3)	16 (5.2)	54 (17.5)	52 (16.8)	57 (18.4)	59 (19.1)	37 (12.0)	23 (7.4)	2 (0.6)					309 (100.0)	41	350	151.16	9.26
合計 (%)	38 (0.1)	70 (0.2)	289 (0.8)	1,163 (3.2)	2,995 (8.1)	5,212 (14.1)	6,078 (16.5)	7,176 (19.5)	6,722 (18.2)	4,784 (13.0)	1,786 (4.8)	493 (1.3)	77 (0.2)	9 (0.0)	36,892 (100.0)	3,051	39,943	160.74	9.54
不明 (%)							1 (33.3)	1 (33.3)		1 (33.3)					3 (100.0)		3	164.33	6.51
記載なし (%)																			
総計 (%)	38 (0.1)	70 (0.2)	289 (0.8)	1,163 (3.2)	2,995 (8.1)	5,212 (14.1)	6,079 (16.5)	7,177 (19.5)	6,722 (18.2)	4,785 (13.0)	1,786 (4.8)	493 (1.3)	77 (0.2)	9 (0.0)	36,895 (100.0)	3,051	39,946	160.74	9.54
平均	67.47	74.01	75.13	74.07	70.97	67.82	66.26	65.53	63.19	59.20	56.24	52.88	52.01	45.56	64.88	66.15	64.98		
標準偏差	14.78	17.61	12.79	11.59	11.22	11.46	11.89	11.60	11.49	11.38	11.03	9.93	10.33	7.95	12.32	12.98	12.38		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査