

表 2377 身長(cm) 透析後体重(kg)別（血液透析濾過患者 女性のみ 透析回数週3回）

透析後体重	130未満	130～	135～	140～	145～	150～	155～	160～	165～	170～	175～	180～	185～	190～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)						2 (66.7)	1 (33.3)								3 (100.0)		3	151.67	2.89
20～ (%)	6 (9.1)	7 (10.6)	10 (15.2)	15 (22.7)	13 (19.7)	7 (10.6)	4 (6.1)	3 (4.5)	1 (1.5)						66 (100.0)	4	70	142.33	10.43
30～ (%)	15 (0.7)	39 (1.7)	129 (5.8)	401 (17.9)	712 (31.8)	659 (29.4)	221 (9.9)	54 (2.4)	3 (0.1)	2 (0.1)	2 (0.1)	1 (0.0)			2,238 (100.0)	154	2,392	147.82	6.55
40～ (%)	6 (0.1)	9 (0.1)	106 (1.8)	508 (8.4)	1,348 (22.4)	2,036 (33.8)	1,422 (23.6)	516 (8.6)	71 (1.2)	6 (0.1)					6,028 (100.0)	396	6,424	151.80	6.20
50～ (%)	3 (0.1)	6 (0.2)	27 (0.8)	148 (4.2)	547 (15.7)	1,054 (30.2)	1,033 (29.6)	529 (15.1)	125 (3.6)	16 (0.5)	3 (0.1)	1 (0.0)			3,492 (100.0)	229	3,721	154.14	6.44
60～ (%)	1 (0.1)		3 (0.3)	31 (2.7)	133 (11.4)	321 (27.6)	373 (32.0)	217 (18.6)	65 (5.6)	13 (1.1)	7 (0.6)				1,164 (100.0)	95	1,259	155.65	6.11
70～ (%)			1 (0.3)	5 (1.4)	23 (6.5)	65 (18.5)	133 (37.8)	89 (25.3)	28 (8.0)	7 (2.0)		1 (0.3)			352 (100.0)	24	376	157.44	5.84
80～ (%)					10 (7.3)	18 (13.1)	44 (32.1)	41 (29.9)	16 (11.7)	4 (2.9)	2 (1.5)	2 (1.5)			137 (100.0)	9	146	159.28	6.57
90～ (%)					2 (7.7)	4 (15.4)	6 (23.1)	6 (23.1)	4 (15.4)	4 (15.4)					26 (100.0)	1	27	160.35	7.64
100～ (%)							2 (50.0)	1 (25.0)		1 (25.0)					4 (100.0)	1	5	162.50	5.74
110～ (%)							1 (50.0)			1 (50.0)					2 (100.0)	2	4	163.50	10.61
120～ (%)																			
合計 (%)	31 (0.2)	61 (0.5)	276 (2.0)	1,108 (8.2)	2,788 (20.6)	4,166 (30.8)	3,240 (24.0)	1,456 (10.8)	313 (2.3)	54 (0.4)	14 (0.1)	5 (0.0)			13,512 (100.0)	915	14,427	152.28	6.88
記載なし (%)	1 (0.9)	1 (0.9)	4 (3.5)	10 (8.8)	17 (14.9)	26 (22.8)	37 (32.5)	11 (9.6)	5 (4.4)		2 (1.8)				114 (100.0)	211	325	152.81	8.65
総計 (%)	32 (0.2)	62 (0.5)	280 (2.1)	1,118 (8.2)	2,805 (20.6)	4,192 (30.8)	3,277 (24.0)	1,467 (10.8)	318 (2.3)	54 (0.4)	16 (0.1)	5 (0.0)			13,626 (100.0)	1,126	14,752	152.28	6.89
平均	38.80	37.68	40.97	43.09	45.58	48.14	51.59	54.36	58.17	65.27	61.40	64.78			48.80	49.16	48.82		
標準偏差	9.57	7.37	7.55	7.71	8.42	8.88	9.98	10.87	11.53	17.31	12.61	20.79			10.10	10.83	10.15		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査