

表 2379 身長(cm) 体重減少量(kg)別（血液透析濾過患者 男性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上）

体重減少量	130未満	130～	135～	140～	145～	150～	155～	160～	165～	170～	175～	180～	185～	190～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.0未満 (%)					4 (6.9)	3 (5.2)	6 (10.3)	14 (24.1)	15 (25.9)	6 (10.3)	8 (13.8)	2 (3.4)			58 (100.0)		58	164.52	8.43
0.0～ (%)	1 (0.2)	1 (0.2)		2 (0.3)	5 (0.8)	43 (7.0)	82 (13.4)	162 (26.4)	180 (29.3)	98 (16.0)	31 (5.0)	8 (1.3)	1 (0.2)		614 (100.0)	47	661	164.35	7.04
1.0～ (%)	1 (0.0)	5 (0.2)	1 (0.0)	15 (0.5)	56 (1.7)	248 (7.6)	534 (16.5)	918 (28.3)	839 (25.9)	456 (14.1)	140 (4.3)	26 (0.8)	4 (0.1)		3,243 (100.0)	198	3,441	163.39	7.04
2.0～ (%)	3 (0.0)	2 (0.0)	3 (0.0)	13 (0.2)	71 (0.9)	403 (5.0)	1,160 (14.5)	2,189 (27.3)	2,231 (27.8)	1,408 (17.6)	436 (5.4)	81 (1.0)	18 (0.2)		8,018 (100.0)	432	8,450	164.64	6.70
3.0～ (%)	1 (0.0)		1 (0.0)	7 (0.1)	33 (0.6)	143 (2.4)	494 (8.4)	1,288 (21.9)	1,714 (29.2)	1,427 (24.3)	578 (9.8)	164 (2.8)	17 (0.3)	3 (0.1)	5,870 (100.0)	353	6,223	167.11	6.81
4.0～ (%)					1 (0.1)	21 (1.1)	98 (5.2)	285 (15.3)	494 (26.5)	589 (31.5)	252 (13.5)	112 (6.0)	13 (0.7)	2 (0.1)	1,867 (100.0)	111	1,978	169.43	6.44
5.0～ (%)					1 (0.3)	3 (0.9)	7 (2.0)	32 (9.3)	70 (20.3)	116 (33.7)	83 (24.1)	28 (8.1)	4 (1.2)		344 (100.0)	31	375	171.59	6.25
6.0～ (%)							1 (2.0)	1 (2.0)	10 (20.0)	12 (24.0)	14 (28.0)	5 (10.0)	5 (10.0)	2 (4.0)	50 (100.0)	2	52	174.88	7.53
7.0～ (%)						1 (8.3)	1 (8.3)	1 (8.3)	1 (8.3)	5 (41.7)	2 (16.7)	1 (8.3)			12 (100.0)	1	13	168.75	8.41
8.0～ (%)							1 (5.0)	5 (25.0)	3 (15.0)	9 (45.0)	2 (10.0)				20 (100.0)	2	22	169.05	5.35
合計 (%)	6 (0.0)	8 (0.0)	5 (0.0)	37 (0.2)	171 (0.9)	865 (4.3)	2,384 (11.9)	4,895 (24.4)	5,557 (27.7)	4,126 (20.5)	1,546 (7.7)	427 (2.1)	62 (0.3)	7 (0.0)	20,096 (100.0)	1,177	21,273	165.75	7.07
記載なし (%)			1 (0.6)	1 (0.6)	1 (0.6)	7 (3.9)	20 (11.0)	50 (27.6)	50 (27.6)	39 (21.5)	10 (5.5)	2 (1.1)			181 (100.0)	322	503	165.23	6.78
総計 (%)	6 (0.0)	8 (0.0)	6 (0.0)	38 (0.2)	172 (0.8)	872 (4.3)	2,404 (11.9)	4,945 (24.4)	5,607 (27.7)	4,165 (20.5)	1,556 (7.7)	429 (2.1)	62 (0.3)	7 (0.0)	20,277 (100.0)	1,499	21,776	165.74	7.07
平均	2.10	1.55	2.32	2.15	2.18	2.27	2.46	2.61	2.77	3.05	3.23	3.49	3.55	4.56	2.78	2.80	2.78		
標準偏差	1.11	0.70	0.68	0.81	0.86	0.86	0.88	0.96	1.04	1.19	1.14	1.14	1.43	1.17	1.07	1.10	1.08		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査