

表 2381 身長(cm) 体重減少率(%)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

体重減少率	130未満	130～	135～	140～	145～	150～	155～	160～	165～	170～	175～	180～	185～	190～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
1.0未満 (%)	2 (0.4)		3 (0.5)	15 (2.7)	47 (8.5)	82 (14.9)	90 (16.3)	113 (20.5)	102 (18.5)	61 (11.1)	27 (4.9)	8 (1.5)	1 (0.2)		551 (100.0)	36	587	160.48	10.12
1.0～ (%)	3 (0.3)	2 (0.2)	7 (0.7)	23 (2.3)	96 (9.4)	144 (14.1)	182 (17.9)	195 (19.2)	194 (19.1)	120 (11.8)	41 (4.0)	9 (0.9)	2 (0.2)		1,018 (100.0)	73	1,091	160.30	9.19
2.0～ (%)	2 (0.1)	10 (0.3)	20 (0.7)	82 (2.9)	209 (7.3)	434 (15.1)	479 (16.7)	582 (20.3)	548 (19.1)	320 (11.2)	138 (4.8)	32 (1.1)	9 (0.3)		2,865 (100.0)	165	3,030	160.62	9.25
3.0～ (%)	6 (0.1)	6 (0.1)	54 (0.8)	206 (3.2)	524 (8.1)	905 (13.9)	1,062 (16.4)	1,273 (19.6)	1,197 (18.4)	852 (13.1)	308 (4.7)	79 (1.2)	17 (0.3)	1 (0.0)	6,490 (100.0)	403	6,893	160.79	9.41
4.0～ (%)	6 (0.1)	15 (0.2)	67 (0.8)	238 (2.7)	661 (7.4)	1,213 (13.7)	1,457 (16.4)	1,744 (19.6)	1,644 (18.5)	1,225 (13.8)	465 (5.2)	127 (1.4)	16 (0.2)	3 (0.0)	8,881 (100.0)	496	9,377	161.19	9.47
5.0～ (%)	6 (0.1)	11 (0.2)	51 (0.7)	233 (3.3)	558 (8.0)	1,002 (14.3)	1,169 (16.7)	1,292 (18.5)	1,229 (17.6)	944 (13.5)	363 (5.2)	121 (1.7)	9 (0.1)	1 (0.0)	6,989 (100.0)	435	7,424	160.84	9.66
6.0～ (%)	7 (0.2)	7 (0.2)	26 (0.7)	124 (3.5)	318 (9.0)	523 (14.9)	593 (16.9)	670 (19.1)	641 (18.2)	413 (11.7)	145 (4.1)	40 (1.1)	7 (0.2)	2 (0.1)	3,516 (100.0)	209	3,725	160.16	9.75
7.0～ (%)		5 (0.4)	10 (0.8)	46 (3.5)	129 (9.7)	226 (17.1)	211 (15.9)	258 (19.5)	209 (15.8)	164 (12.4)	56 (4.2)	10 (0.8)	1 (0.1)		1,325 (100.0)	83	1,408	159.74	9.33
8.0～ (%)			2 (0.5)	17 (4.1)	51 (12.4)	69 (16.8)	74 (18.0)	78 (19.0)	58 (14.1)	48 (11.7)	11 (2.7)	2 (0.5)			410 (100.0)	26	436	158.77	9.07
9.0～ (%)	1 (0.6)		1 (0.6)	12 (6.7)	20 (11.1)	33 (18.3)	34 (18.9)	31 (17.2)	19 (10.6)	21 (11.7)	5 (2.8)	3 (1.7)			180 (100.0)	10	190	158.31	10.01
合計 (%)	33 (0.1)	56 (0.2)	241 (0.7)	996 (3.1)	2,613 (8.1)	4,631 (14.4)	5,351 (16.6)	6,236 (19.4)	5,841 (18.1)	4,168 (12.9)	1,559 (4.8)	431 (1.3)	62 (0.2)	7 (0.0)	32,225 (100.0)	1,936	34,161	160.72	9.52
記載なし (%)	1 (0.3)	1 (0.3)	5 (1.6)	11 (3.5)	19 (6.1)	33 (10.6)	58 (18.7)	66 (21.3)	59 (19.0)	43 (13.9)	12 (3.9)	2 (0.6)			310 (100.0)	500	810	160.64	9.63
総計 (%)	34 (0.1)	57 (0.2)	246 (0.8)	1,007 (3.1)	2,632 (8.1)	4,664 (14.3)	5,409 (16.6)	6,302 (19.4)	5,900 (18.1)	4,211 (12.9)	1,571 (4.8)	433 (1.3)	62 (0.2)	7 (0.0)	32,535 (100.0)	2,436	34,971	160.72	9.52
平均	4.41	4.63	4.55	4.76	4.68	4.63	4.60	4.56	4.52	4.61	4.54	4.61	4.17	5.17	4.59	4.60	4.59		
標準偏差	2.09	1.62	1.52	1.64	1.68	1.63	1.60	1.58	1.54	1.54	1.48	1.42	1.45	0.96	1.58	1.61	1.59		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査