

表 2382 身長(cm) 体重減少率(%)別（血液透析濾過患者 男性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上）

体重減少率	130未満	130～	135～	140～	145～	150～	155～	160～	165～	170～	175～	180～	185～	190～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
1.0未満 (%)	1 (0.3)				5 (1.5)	20 (5.9)	35 (10.3)	85 (25.1)	97 (28.6)	61 (18.0)	26 (7.7)	8 (2.4)	1 (0.3)		339 (100.0)	24	363	165.33	7.34
1.0～ (%)		2 (0.3)		2 (0.3)	4 (0.6)	35 (5.6)	71 (11.5)	152 (24.5)	183 (29.5)	120 (19.4)	40 (6.5)	9 (1.5)	2 (0.3)		620 (100.0)	35	655	165.22	7.11
2.0～ (%)			1 (0.1)	2 (0.1)	10 (0.6)	90 (5.0)	217 (12.1)	459 (25.6)	520 (29.0)	315 (17.6)	138 (7.7)	32 (1.8)	9 (0.5)		1,793 (100.0)	96	1,889	165.47	6.86
3.0～ (%)		2 (0.0)		8 (0.2)	39 (1.0)	177 (4.4)	468 (11.5)	1,003 (24.7)	1,130 (27.8)	841 (20.7)	304 (7.5)	78 (1.9)	17 (0.4)	1 (0.0)	4,068 (100.0)	238	4,306	165.72	6.98
4.0～ (%)	3 (0.1)	1 (0.0)	1 (0.0)	7 (0.1)	43 (0.8)	215 (3.8)	658 (11.6)	1,364 (24.0)	1,564 (27.5)	1,211 (21.3)	464 (8.2)	127 (2.2)	16 (0.3)	3 (0.1)	5,677 (100.0)	313	5,990	166.01	7.05
5.0～ (%)		2 (0.0)	2 (0.0)	12 (0.3)	32 (0.7)	160 (3.7)	518 (12.0)	1,011 (23.4)	1,157 (26.8)	934 (21.6)	358 (8.3)	119 (2.8)	9 (0.2)	1 (0.0)	4,315 (100.0)	272	4,587	166.04	7.08
6.0～ (%)	2 (0.1)		1 (0.0)	2 (0.1)	20 (0.9)	96 (4.5)	271 (12.7)	521 (24.4)	624 (29.2)	408 (19.1)	144 (6.7)	40 (1.9)	7 (0.3)	2 (0.1)	2,138 (100.0)	127	2,265	165.49	7.23
7.0～ (%)		1 (0.1)		1 (0.1)	12 (1.5)	46 (5.8)	90 (11.4)	209 (26.4)	203 (25.7)	163 (20.6)	56 (7.1)	9 (1.1)	1 (0.1)		791 (100.0)	49	840	165.04	7.07
8.0～ (%)				1 (0.4)	4 (1.7)	16 (6.6)	39 (16.1)	64 (26.4)	57 (23.6)	48 (19.8)	11 (4.5)	2 (0.8)			242 (100.0)	17	259	164.00	7.03
9.0～ (%)				2 (2.0)	2 (2.0)	10 (9.8)	16 (15.7)	24 (23.5)	19 (18.6)	21 (20.6)	5 (4.9)	3 (2.9)			102 (100.0)	5	107	163.84	8.52
合計 (%)	6 (0.0)	8 (0.0)	5 (0.0)	37 (0.2)	171 (0.9)	865 (4.3)	2,383 (11.9)	4,892 (24.4)	5,554 (27.7)	4,122 (20.5)	1,546 (7.7)	427 (2.1)	62 (0.3)	7 (0.0)	20,085 (100.0)	1,176	21,261	165.75	7.07
記載なし (%)			1 (0.5)	1 (0.5)	1 (0.5)	7 (3.6)	21 (10.9)	53 (27.6)	53 (27.6)	43 (22.4)	10 (5.2)	2 (1.0)			192 (100.0)	323	515	165.34	6.68
総計 (%)	6 (0.0)	8 (0.0)	6 (0.0)	38 (0.2)	172 (0.8)	872 (4.3)	2,404 (11.9)	4,945 (24.4)	5,607 (27.7)	4,165 (20.5)	1,556 (7.7)	429 (2.1)	62 (0.3)	7 (0.0)	20,277 (100.0)	1,499	21,776	165.74	7.07
平均	4.61	3.95	4.88	4.94	4.74	4.58	4.62	4.57	4.54	4.61	4.54	4.60	4.17	5.17	4.57	4.63	4.58		
標準偏差	2.28	1.97	1.52	1.87	1.83	1.77	1.58	1.58	1.55	1.54	1.48	1.41	1.45	0.96	1.56	1.59	1.57		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査