

表 2383 身長(cm) 体重減少率(%)別（血液透析濾過患者 女性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上）

体重減少率	130未満	130～	135～	140～	145～	150～	155～	160～	165～	170～	175～	180～	185～	190～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
1.0未満 (%)	1 (0.5)		3 (1.4)	15 (7.1)	42 (19.8)	62 (29.2)	55 (25.9)	28 (13.2)	5 (2.4)		1 (0.5)				212 (100.0)	12	224	152.73	9.08
1.0～ (%)	3 (0.8)		7 (1.8)	21 (5.3)	92 (23.1)	109 (27.4)	111 (27.9)	43 (10.8)	11 (2.8)		1 (0.3)				398 (100.0)	38	436	152.64	6.38
2.0～ (%)	2 (0.2)	10 (0.9)	19 (1.8)	80 (7.5)	199 (18.6)	344 (32.1)	262 (24.4)	123 (11.5)	28 (2.6)	5 (0.5)					1,072 (100.0)	69	1,141	152.50	6.67
3.0～ (%)	6 (0.2)	4 (0.2)	54 (2.2)	198 (8.2)	485 (20.0)	728 (30.1)	594 (24.5)	270 (11.1)	67 (2.8)	11 (0.5)	4 (0.2)	1 (0.0)			2,422 (100.0)	165	2,587	152.50	6.77
4.0～ (%)	3 (0.1)	14 (0.4)	66 (2.1)	231 (7.2)	618 (19.3)	998 (31.1)	799 (24.9)	380 (11.9)	80 (2.5)	14 (0.4)	1 (0.0)				3,204 (100.0)	183	3,387	152.65	6.79
5.0～ (%)	6 (0.2)	9 (0.3)	49 (1.8)	221 (8.3)	526 (19.7)	842 (31.5)	651 (24.3)	281 (10.5)	72 (2.7)	10 (0.4)	5 (0.2)	2 (0.1)			2,674 (100.0)	163	2,837	152.44	7.00
6.0～ (%)	5 (0.4)	7 (0.5)	25 (1.8)	122 (8.9)	298 (21.6)	427 (31.0)	322 (23.4)	149 (10.8)	17 (1.2)	5 (0.4)	1 (0.1)				1,378 (100.0)	82	1,460	151.89	6.99
7.0～ (%)		4 (0.7)	10 (1.9)	45 (8.4)	117 (21.9)	180 (33.7)	121 (22.7)	49 (9.2)	6 (1.1)	1 (0.2)		1 (0.2)			534 (100.0)	34	568	151.90	6.23
8.0～ (%)			2 (1.2)	16 (9.5)	47 (28.0)	53 (31.5)	35 (20.8)	14 (8.3)	1 (0.6)						168 (100.0)	9	177	151.24	5.79
9.0～ (%)	1 (1.3)		1 (1.3)	10 (12.8)	18 (23.1)	23 (29.5)	18 (23.1)	7 (9.0)							78 (100.0)	5	83	151.06	6.64
合計 (%)	27 (0.2)	48 (0.4)	236 (1.9)	959 (7.9)	2,442 (20.1)	3,766 (31.0)	2,968 (24.4)	1,344 (11.1)	287 (2.4)	46 (0.4)	13 (0.1)	4 (0.0)			12,140 (100.0)	760	12,900	152.41	6.85
記載なし (%)	1 (0.8)	1 (0.8)	4 (3.4)	10 (8.5)	18 (15.3)	26 (22.0)	37 (31.4)	13 (11.0)	6 (5.1)		2 (1.7)				118 (100.0)	177	295	152.98	8.76
総計 (%)	28 (0.2)	49 (0.4)	240 (2.0)	969 (7.9)	2,460 (20.1)	3,792 (30.9)	3,005 (24.5)	1,357 (11.1)	293 (2.4)	46 (0.4)	15 (0.1)	4 (0.0)			12,258 (100.0)	937	13,195	152.42	6.87
平均	4.36	4.74	4.54	4.76	4.67	4.65	4.57	4.53	4.32	4.55	4.08	5.90			4.62	4.55	4.61		
標準偏差	2.08	1.55	1.53	1.63	1.67	1.59	1.62	1.58	1.42	1.26	1.79	1.65			1.61	1.64	1.62		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査