

表 2387 身長(cm) 透析前BUN(mg/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

透析前BUN	130未満	130～	135～	140～	145～	150～	155～	160～	165～	170～	175～	180～	185～	190～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)	1 (3.0)			2 (6.1)	2 (6.1)	6 (18.2)	8 (24.2)	9 (27.3)	2 (6.1)	3 (9.1)					33 (100.0)	6	39	156.91	8.90
20～ (%)			5 (1.7)	10 (3.5)	38 (13.3)	31 (10.8)	60 (21.0)	62 (21.7)	38 (13.3)	26 (9.1)	12 (4.2)	3 (1.0)	1 (0.3)		286 (100.0)	23	309	159.11	9.35
30～ (%)	3 (0.2)	4 (0.3)	16 (1.0)	67 (4.3)	171 (11.0)	236 (15.2)	263 (16.9)	302 (19.4)	269 (17.3)	155 (10.0)	53 (3.4)	13 (0.8)	3 (0.2)		1,555 (100.0)	98	1,653	159.10	9.52
40～ (%)	7 (0.2)	11 (0.2)	45 (1.0)	159 (3.5)	392 (8.7)	672 (14.9)	769 (17.1)	881 (19.6)	782 (17.4)	529 (11.8)	189 (4.2)	60 (1.3)	3 (0.1)		4,499 (100.0)	286	4,785	160.06	9.60
50～ (%)	9 (0.1)	15 (0.2)	54 (0.7)	271 (3.5)	633 (8.1)	1,100 (14.0)	1,307 (16.6)	1,486 (18.9)	1,469 (18.7)	1,011 (12.9)	377 (4.8)	98 (1.2)	20 (0.3)	1 (0.0)	7,851 (100.0)	467	8,318	160.70	9.56
60～ (%)	6 (0.1)	9 (0.1)	58 (0.7)	234 (2.8)	643 (7.7)	1,191 (14.3)	1,327 (16.0)	1,617 (19.5)	1,533 (18.5)	1,109 (13.4)	437 (5.3)	123 (1.5)	16 (0.2)	3 (0.0)	8,306 (100.0)	498	8,804	161.06	9.47
70～ (%)	2 (0.0)	9 (0.2)	38 (0.7)	143 (2.5)	432 (7.5)	814 (14.1)	962 (16.7)	1,127 (19.6)	1,052 (18.3)	817 (14.2)	282 (4.9)	68 (1.2)	10 (0.2)	2 (0.0)	5,758 (100.0)	328	6,086	161.14	9.26
80～ (%)	3 (0.1)	1 (0.0)	13 (0.5)	70 (2.6)	186 (7.0)	396 (14.9)	473 (17.8)	494 (18.6)	479 (18.0)	355 (13.4)	134 (5.0)	47 (1.8)	5 (0.2)		2,656 (100.0)	175	2,831	161.13	9.30
90～ (%)	3 (0.3)	5 (0.5)	10 (1.0)	31 (3.1)	90 (9.1)	128 (13.0)	144 (14.6)	200 (20.3)	169 (17.1)	132 (13.4)	58 (5.9)	13 (1.3)	2 (0.2)	1 (0.1)	986 (100.0)	65	1,051	160.76	10.65
100～ (%)				13 (4.9)	24 (9.1)	40 (15.1)	35 (13.2)	61 (23.0)	43 (16.2)	29 (10.9)	15 (5.7)	4 (1.5)	1 (0.4)		265 (100.0)	14	279	160.47	9.66
110～ (%)		2 (2.7)		1 (1.4)	5 (6.8)	8 (11.0)	12 (16.4)	11 (15.1)	21 (28.8)	7 (9.6)	4 (5.5)	1 (1.4)	1 (1.4)		73 (100.0)	1	74	161.64	10.20
120～ (%)			1 (5.6)	1 (5.6)	3 (16.7)	4 (22.2)	2 (11.1)		1 (5.6)	6 (33.3)					18 (100.0)	2	20	158.06	11.27
合計 (%)	34 (0.1)	56 (0.2)	240 (0.7)	1,002 (3.1)	2,619 (8.1)	4,626 (14.3)	5,362 (16.6)	6,250 (19.4)	5,858 (18.1)	4,179 (12.9)	1,561 (4.8)	430 (1.3)	62 (0.2)	7 (0.0)	32,286 (100.0)	1,963	34,249	160.72	9.52
記載なし (%)		1 (0.4)	6 (2.4)	5 (2.0)	13 (5.2)	38 (15.3)	47 (18.9)	52 (20.9)	42 (16.9)	32 (12.9)	10 (4.0)	3 (1.2)			249 (100.0)	473	722	160.44	9.38
総計 (%)	34 (0.1)	57 (0.2)	246 (0.8)	1,007 (3.1)	2,632 (8.1)	4,664 (14.3)	5,409 (16.6)	6,302 (19.4)	5,900 (18.1)	4,211 (12.9)	1,571 (4.8)	433 (1.3)	62 (0.2)	7 (0.0)	32,535 (100.0)	2,436	34,971	160.72	9.52
平均	59.32	62.39	59.90	60.62	61.11	62.11	61.98	62.19	62.44	63.26	63.46	63.34	63.40	72.00	62.25	61.91	62.23		
標準偏差	19.03	18.60	15.67	15.80	15.87	15.08	15.08	15.12	14.69	14.67	14.66	14.76	17.04	13.47	15.06	15.43	15.08		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査