

表 2396 身長(cm) nPCR(g/kg/day)別（血液透析濾過患者 男性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上）

nPCR	130未満	130～	135～	140～	145～	150～	155～	160～	165～	170～	175～	180～	185～	190～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.4未満 (%)							4 (23.5)	5 (29.4)	4 (23.5)	3 (17.6)		1 (5.9)			17 (100.0)	3	20	164.47	6.71
0.4～ (%)			1 (0.1)		8 (1.2)	38 (5.5)	101 (14.6)	182 (26.3)	185 (26.8)	115 (16.6)	43 (6.2)	14 (2.0)	4 (0.6)		691 (100.0)	37	728	164.78	7.06
0.6～ (%)	1 (0.0)	2 (0.0)	1 (0.0)	10 (0.2)	44 (0.8)	252 (4.4)	679 (11.9)	1,386 (24.3)	1,586 (27.8)	1,144 (20.0)	452 (7.9)	137 (2.4)	20 (0.3)	1 (0.0)	5,715 (100.0)	364	6,079	165.77	7.09
0.8～ (%)	2 (0.0)	5 (0.1)	2 (0.0)	18 (0.2)	77 (0.9)	376 (4.2)	1,023 (11.3)	2,172 (24.1)	2,507 (27.8)	1,902 (21.1)	724 (8.0)	186 (2.1)	27 (0.3)	4 (0.0)	9,025 (100.0)	480	9,505	165.89	7.07
1.0～ (%)	2 (0.1)	1 (0.0)	1 (0.0)	7 (0.2)	25 (0.7)	145 (4.2)	422 (12.4)	839 (24.6)	950 (27.8)	709 (20.8)	240 (7.0)	64 (1.9)	9 (0.3)	2 (0.1)	3,416 (100.0)	197	3,613	165.63	7.00
1.2～ (%)	1 (0.2)			2 (0.4)	9 (1.7)	30 (5.5)	62 (11.4)	144 (26.6)	143 (26.4)	102 (18.8)	36 (6.6)	11 (2.0)	2 (0.4)		542 (100.0)	27	569	165.11	7.51
1.4～ (%)						1 (2.2)	5 (11.1)	10 (22.2)	16 (35.6)	10 (22.2)	3 (6.7)				45 (100.0)	3	48	166.02	5.94
1.6～ (%)								1 (20.0)	1 (20.0)	3 (60.0)					5 (100.0)		5	168.40	2.88
1.8～ (%)																			
2.0～ (%)								2 (66.7)		1 (33.3)					3 (100.0)		3	165.33	5.86
合計 (%)	6 (0.0)	8 (0.0)	5 (0.0)	37 (0.2)	163 (0.8)	842 (4.3)	2,296 (11.8)	4,741 (24.4)	5,392 (27.7)	3,989 (20.5)	1,498 (7.7)	413 (2.1)	62 (0.3)	7 (0.0)	19,459 (100.0)	1,111	20,570	165.75	7.07
記載なし (%)			1 (0.1)	1 (0.1)	9 (1.1)	30 (3.7)	108 (13.2)	204 (24.9)	215 (26.3)	176 (21.5)	58 (7.1)	16 (2.0)			818 (100.0)	388	1,206	165.60	6.87
総計 (%)	6 (0.0)	8 (0.0)	6 (0.0)	38 (0.2)	172 (0.8)	872 (4.3)	2,404 (11.9)	4,945 (24.4)	5,607 (27.7)	4,165 (20.5)	1,556 (7.7)	429 (2.1)	62 (0.3)	7 (0.0)	20,277 (100.0)	1,499	21,776	165.74	7.07
平均	1.00	0.88	0.80	0.93	0.88	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.86	0.86	0.84	0.91	0.87	0.86	0.87		
標準偏差	0.19	0.12	0.19	0.16	0.18	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.15	0.16	0.16	0.11	0.16	0.17	0.16		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査