

表 2404 身長(cm) 透析前リン濃度(mg/dL)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

透析前リン濃度	130未満	130～	135～	140～	145～	150～	155～	160～	165～	170～	175～	180～	185～	190～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
3未満 (%)	1 (0.1)	6 (0.6)	9 (0.9)	57 (5.4)	126 (11.9)	166 (15.7)	172 (16.3)	214 (20.3)	161 (15.3)	98 (9.3)	28 (2.7)	15 (1.4)	2 (0.2)		1,055 (100.0)	78	1,133	158.59	9.69
3.0～ (%)	5 (0.3)	5 (0.3)	19 (1.3)	70 (4.8)	132 (9.0)	232 (15.8)	258 (17.6)	291 (19.8)	248 (16.9)	153 (10.4)	50 (3.4)	5 (0.3)			1,468 (100.0)	106	1,574	158.95	9.48
3.5～ (%)	2 (0.1)	4 (0.2)	32 (1.2)	106 (4.0)	252 (9.5)	417 (15.7)	449 (16.9)	541 (20.4)	450 (16.9)	285 (10.7)	89 (3.4)	23 (0.9)	6 (0.2)		2,656 (100.0)	193	2,849	159.51	9.34
4.0～ (%)	3 (0.1)	10 (0.2)	36 (0.8)	160 (3.7)	406 (9.5)	625 (14.6)	712 (16.6)	812 (18.9)	798 (18.6)	502 (11.7)	175 (4.1)	43 (1.0)	8 (0.2)		4,290 (100.0)	275	4,565	159.99	9.67
4.5～ (%)	5 (0.1)	11 (0.2)	47 (0.9)	169 (3.1)	476 (8.8)	779 (14.4)	922 (17.1)	1,046 (19.4)	967 (17.9)	634 (11.7)	257 (4.8)	75 (1.4)	9 (0.2)		5,397 (100.0)	315	5,712	160.41	9.47
5.0～ (%)	7 (0.1)	8 (0.1)	49 (0.8)	165 (2.9)	504 (8.7)	845 (14.6)	979 (17.0)	1,100 (19.1)	991 (17.2)	738 (12.8)	294 (5.1)	78 (1.4)	14 (0.2)	2 (0.0)	5,774 (100.0)	360	6,134	160.64	9.52
5.5～ (%)	4 (0.1)	5 (0.1)	29 (0.6)	155 (3.1)	378 (7.6)	723 (14.5)	837 (16.8)	944 (19.0)	918 (18.4)	667 (13.4)	247 (5.0)	63 (1.3)	9 (0.2)	2 (0.0)	4,981 (100.0)	318	5,299	160.93	9.45
6.0～ (%)			7 (0.8)	24 (2.7)	65 (7.3)	129 (14.4)	140 (15.7)	172 (19.2)	177 (19.8)	118 (13.2)	51 (5.7)	7 (0.8)	4 (0.4)		894 (100.0)	56	950	161.24	9.27
6.1～ (%)	1 (0.0)	5 (0.2)	17 (0.6)	89 (2.9)	208 (6.9)	385 (12.8)	463 (15.3)	589 (19.5)	616 (20.4)	449 (14.9)	154 (5.1)	40 (1.3)	2 (0.1)	1 (0.0)	3,019 (100.0)	225	3,244	161.56	9.25
6.5～ (%)	4 (0.2)	7 (0.3)	13 (0.5)	56 (2.1)	197 (7.5)	318 (12.1)	429 (16.4)	520 (19.8)	470 (17.9)	377 (14.4)	177 (6.8)	47 (1.8)	6 (0.2)	1 (0.0)	2,622 (100.0)	184	2,806	161.81	9.46
7.0～ (%)	1 (0.1)	3 (0.2)	6 (0.4)	47 (2.8)	92 (5.5)	204 (12.3)	271 (16.3)	328 (19.7)	324 (19.5)	254 (15.3)	99 (6.0)	31 (1.9)	3 (0.2)		1,663 (100.0)	112	1,775	162.04	9.22
7.5～ (%)	2 (0.2)	1 (0.1)	9 (0.9)	27 (2.6)	55 (5.3)	126 (12.1)	145 (13.9)	235 (22.5)	189 (18.1)	175 (16.7)	52 (5.0)	23 (2.2)	5 (0.5)	1 (0.1)	1,045 (100.0)	59	1,104	162.15	10.40
8.0～ (%)			4 (0.7)	12 (2.0)	35 (5.8)	77 (12.8)	80 (13.3)	110 (18.3)	128 (21.3)	109 (18.1)	29 (4.8)	13 (2.2)	2 (0.3)	2 (0.3)	601 (100.0)	50	651	162.71	9.38
8.5～ (%)	2 (0.5)	2 (0.5)	1 (0.2)	4 (1.0)	17 (4.2)	59 (14.6)	42 (10.4)	92 (22.8)	81 (20.1)	60 (14.9)	32 (7.9)	9 (2.2)	2 (0.5)		403 (100.0)	20	423	162.84	9.79
9.0～ (%)	1 (0.2)	2 (0.3)	4 (0.6)	13 (2.1)	28 (4.5)	64 (10.2)	95 (15.2)	102 (16.3)	134 (21.4)	120 (19.1)	40 (6.4)	19 (3.0)	5 (0.8)		627 (100.0)	55	682	163.34	9.59
合計 (%)	38 (0.1)	69 (0.2)	282 (0.8)	1,154 (3.2)	2,971 (8.1)	5,149 (14.1)	5,994 (16.4)	7,096 (19.4)	6,652 (18.2)	4,739 (13.0)	1,774 (4.9)	491 (1.3)	77 (0.2)	9 (0.0)	36,495 (100.0)	2,406	38,901	160.75	9.54
記載なし (%)		1 (0.3)	7 (1.8)	9 (2.3)	24 (6.0)	63 (15.8)	85 (21.3)	81 (20.3)	70 (17.5)	46 (11.5)	12 (3.0)	2 (0.5)			400 (100.0)	645	1,045	159.93	8.86
総計 (%)	38 (0.1)	70 (0.2)	289 (0.8)	1,163 (3.2)	2,995 (8.1)	5,212 (14.1)	6,079 (16.5)	7,177 (19.5)	6,722 (18.2)	4,785 (13.0)	1,786 (4.8)	493 (1.3)	77 (0.2)	9 (0.0)	36,895 (100.0)	3,051	39,946	160.74	9.54
平均	5.36	5.12	5.06	5.06	5.12	5.25	5.29	5.35	5.42	5.56	5.59	5.74	5.80	6.56	5.35	5.38	5.36		
標準偏差	1.75	1.70	1.37	1.38	1.33	1.38	1.38	1.42	1.43	1.48	1.39	1.57	1.68	1.18	1.42	1.51	1.43		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査