

表 2407 身長(cm) 透析前ヘモグロビン濃度(g/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析前ヘモグロビン濃度	130未満	130～	135～	140～	145～	150～	155～	160～	165～	170～	175～	180～	185～	190～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
5未満 (%)				2 (7.7)	7 (26.9)	2 (7.7)	7 (26.9)	3 (11.5)	4 (15.4)	1 (3.8)					26 (100.0)		26	160.04	9.47
5～ (%)			1 (3.6)	1 (3.6)	4 (14.3)	5 (17.9)	4 (14.3)	5 (17.9)	7 (25.0)			1 (3.6)			28 (100.0)	3	31	162.04	9.68
6～ (%)			1 (0.9)	10 (9.3)	13 (12.1)	16 (15.0)	12 (11.2)	20 (18.7)	20 (18.7)	13 (12.1)	2 (1.9)				107 (100.0)	7	114	158.35	9.54
7～ (%)	2 (0.5)	2 (0.5)	5 (1.2)	14 (3.4)	56 (13.7)	56 (13.7)	69 (16.9)	84 (20.6)	57 (14.0)	44 (10.8)	15 (3.7)	4 (1.0)			408 (100.0)	37	445	158.68	9.94
8～ (%)	1 (0.1)	6 (0.4)	9 (0.6)	77 (5.1)	155 (10.2)	255 (16.8)	270 (17.8)	281 (18.5)	236 (15.5)	155 (10.2)	54 (3.6)	15 (1.0)	4 (0.3)		1,518 (100.0)	119	1,637	159.04	9.53
9～ (%)	10 (0.2)	13 (0.2)	49 (0.9)	207 (3.8)	532 (9.7)	876 (16.0)	970 (17.8)	1,017 (18.6)	935 (17.1)	587 (10.7)	203 (3.7)	53 (1.0)	8 (0.1)	1 (0.0)	5,461 (100.0)	389	5,850	159.47	9.66
10～ (%)	9 (0.1)	20 (0.2)	107 (0.9)	398 (3.3)	1,042 (8.6)	1,765 (14.5)	2,044 (16.8)	2,369 (19.5)	2,178 (17.9)	1,500 (12.3)	533 (4.4)	162 (1.3)	25 (0.2)	3 (0.0)	12,155 (100.0)	792	12,947	160.44	9.48
11～ (%)	12 (0.1)	19 (0.2)	75 (0.7)	312 (2.9)	819 (7.5)	1,500 (13.7)	1,766 (16.2)	2,140 (19.6)	1,982 (18.2)	1,467 (13.4)	632 (5.8)	162 (1.5)	23 (0.2)	1 (0.0)	10,910 (100.0)	667	11,577	161.19	9.51
12～ (%)	3 (0.1)	9 (0.2)	27 (0.7)	93 (2.2)	264 (6.4)	509 (12.3)	656 (15.8)	831 (20.1)	850 (20.5)	609 (14.7)	211 (5.1)	63 (1.5)	13 (0.3)	4 (0.1)	4,142 (100.0)	240	4,382	161.84	9.33
13～ (%)			5 (0.5)	21 (1.9)	58 (5.3)	103 (9.4)	124 (11.3)	218 (19.8)	260 (23.6)	215 (19.5)	77 (7.0)	17 (1.5)	2 (0.2)		1,100 (100.0)	85	1,185	163.58	8.87
14～ (%)	1 (0.2)		2 (0.4)	12 (2.4)	23 (4.6)	38 (7.6)	67 (13.4)	84 (16.8)	106 (21.2)	113 (22.6)	39 (7.8)	13 (2.6)	1 (0.2)		499 (100.0)	24	523	164.14	9.51
合計 (%)	38 (0.1)	69 (0.2)	281 (0.8)	1,146 (3.2)	2,963 (8.2)	5,129 (14.1)	5,985 (16.5)	7,055 (19.4)	6,632 (18.2)	4,714 (13.0)	1,767 (4.9)	490 (1.3)	76 (0.2)	9 (0.0)	36,354 (100.0)	2,363	38,717	160.74	9.54
記載なし (%)		1 (0.2)	8 (1.5)	17 (3.1)	32 (5.9)	83 (15.3)	94 (17.4)	122 (22.6)	90 (16.6)	71 (13.1)	19 (3.5)	3 (0.6)	1 (0.2)		541 (100.0)	688	1,229	160.39	9.04
総計 (%)	38 (0.1)	70 (0.2)	289 (0.8)	1,163 (3.2)	2,995 (8.1)	5,212 (14.1)	6,079 (16.5)	7,177 (19.5)	6,722 (18.2)	4,785 (13.0)	1,786 (4.8)	493 (1.3)	77 (0.2)	9 (0.0)	36,895 (100.0)	3,051	39,946	160.74	9.54
平均	10.57	10.55	10.66	10.60	10.64	10.71	10.78	10.86	10.94	11.02	11.07	11.05	11.04	11.20	10.84	10.76	10.84		
標準偏差	1.38	1.19	1.21	1.28	1.23	1.21	1.21	1.25	1.28	1.32	1.27	1.24	1.22	1.28	1.26	1.27	1.26		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査