

表 2412 身長(cm) 透析前拡張期血圧(mmHg)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析前拡張 期血圧	130未満	130～	135～	140～	145～	150～	155～	160～	165～	170～	175～	180～	185～	190～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)						1 (16.7)	1 (16.7)		4 (66.7)						6 (100.0)	1	7	163.00	5.66
20～ (%)				10 (8.6)	25 (21.6)	22 (19.0)	15 (12.9)	19 (16.4)	14 (12.1)	5 (4.3)	6 (5.2)				116 (100.0)	5	121	155.87	9.51
40～ (%)	5 (0.2)	12 (0.5)	51 (2.0)	164 (6.5)	318 (12.6)	445 (17.6)	487 (19.3)	463 (18.3)	337 (13.3)	177 (7.0)	58 (2.3)	10 (0.4)	1 (0.0)		2,528 (100.0)	152	2,680	157.07	9.41
60～ (%)	14 (0.1)	35 (0.2)	143 (1.0)	544 (3.9)	1,328 (9.5)	2,193 (15.6)	2,463 (17.5)	2,810 (20.0)	2,381 (17.0)	1,483 (10.6)	509 (3.6)	113 (0.8)	22 (0.2)	3 (0.0)	14,041 (100.0)	931	14,972	159.51	9.42
80～ (%)	12 (0.1)	6 (0.1)	37 (0.4)	188 (2.2)	593 (7.0)	1,156 (13.7)	1,322 (15.6)	1,710 (20.2)	1,647 (19.5)	1,204 (14.2)	442 (5.2)	132 (1.6)	15 (0.2)	2 (0.0)	8,466 (100.0)	537	9,003	161.56	9.36
90～ (%)	2 (0.0)	8 (0.2)	18 (0.4)	99 (2.0)	290 (5.8)	553 (11.1)	784 (15.7)	907 (18.1)	1,021 (20.4)	850 (17.0)	339 (6.8)	115 (2.3)	14 (0.3)	3 (0.1)	5,003 (100.0)	314	5,317	162.84	9.29
100～ (%)		5 (0.2)	10 (0.4)	38 (1.5)	118 (4.7)	255 (10.1)	328 (12.9)	446 (17.6)	546 (21.5)	490 (19.3)	216 (8.5)	70 (2.8)	13 (0.5)		2,535 (100.0)	166	2,701	164.03	9.22
120～ (%)				2 (1.3)	9 (5.6)	11 (6.9)	22 (13.8)	27 (16.9)	29 (18.1)	38 (23.8)	18 (11.3)	4 (2.5)			160 (100.0)	9	169	164.93	8.96
140～ (%)				1 (10.0)				1 (10.0)	4 (40.0)	2 (20.0)		2 (20.0)			10 (100.0)	2	12	167.40	11.73
合計 (%)	33 (0.1)	66 (0.2)	259 (0.8)	1,046 (3.2)	2,681 (8.2)	4,636 (14.1)	5,422 (16.5)	6,383 (19.4)	5,983 (18.2)	4,249 (12.9)	1,588 (4.8)	446 (1.4)	65 (0.2)	8 (0.0)	32,865 (100.0)	2,117	34,982	160.72	9.55
記載なし (%)	5 (0.1)	4 (0.1)	30 (0.7)	117 (2.9)	314 (7.8)	576 (14.3)	657 (16.3)	794 (19.7)	739 (18.3)	536 (13.3)	198 (4.9)	47 (1.2)	12 (0.3)	1 (0.0)	4,030 (100.0)	934	4,964	160.87	9.39
総計 (%)	38 (0.1)	70 (0.2)	289 (0.8)	1,163 (3.2)	2,995 (8.1)	5,212 (14.1)	6,079 (16.5)	7,177 (19.5)	6,722 (18.2)	4,785 (13.0)	1,786 (4.8)	493 (1.3)	77 (0.2)	9 (0.0)	36,895 (100.0)	3,051	39,946	160.74	9.54
平均	73.18	72.76	71.29	73.03	75.08	76.87	77.81	78.84	80.90	83.21	84.32	87.30	86.32	86.63	79.16	79.35	79.17		
標準偏差	13.43	16.93	13.64	14.77	14.57	14.24	14.33	14.12	14.49	14.48	14.73	14.66	14.72	8.58	14.70	14.79	14.70		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査