

表 2417 身長(cm) 原疾患別（腹膜透析患者）

原疾患	130未満	130～	135～	140～	145～	150～	155～	160～	165～	170～	175～	180～	185～	190～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 (%)	7 (0.3)	6 (0.3)	17 (0.7)	57 (2.5)	169 (7.4)	309 (13.5)	384 (16.8)	441 (19.3)	443 (19.4)	299 (13.1)	110 (4.8)	37 (1.6)	3 (0.1)	1 (0.0)	2,283 (100.0)	776	3,059	161.04	9.94
慢性腎盂腎炎 (%)			2 (2.6)	6 (7.7)	13 (16.7)	16 (20.5)	12 (15.4)	12 (15.4)	3 (3.8)	11 (14.1)	2 (2.6)	1 (1.3)			78 (100.0)	15	93	156.51	10.51
急速進行性糸球体腎炎 (%)	2 (3.8)				4 (7.5)	5 (9.4)	16 (30.2)	10 (18.9)	7 (13.2)	6 (11.3)	2 (3.8)	1 (1.9)			53 (100.0)	21	74	158.85	12.87
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)				1 (3.4)	4 (13.8)	13 (44.8)	8 (27.6)	2 (6.9)	1 (3.4)						29 (100.0)	3	32	153.48	4.92
その他の分類不能の腎炎 (%)	5 (7.8)		1 (1.6)	2 (3.1)	4 (6.3)	8 (12.5)	9 (14.1)	14 (21.9)	11 (17.2)	4 (6.3)	3 (4.7)	3 (4.7)			64 (100.0)	21	85	156.33	19.71
多発性嚢胞腎 (%)	4 (2.2)			4 (2.2)	11 (6.1)	22 (12.3)	35 (19.6)	34 (19.0)	28 (15.6)	22 (12.3)	16 (8.9)	2 (1.1)	1 (0.6)		179 (100.0)	64	243	160.30	14.63
腎硬化症 (%)	1 (0.1)	1 (0.1)	9 (1.1)	50 (6.1)	78 (9.5)	120 (14.7)	143 (17.5)	160 (19.6)	128 (15.7)	94 (11.5)	30 (3.7)	2 (0.2)	1 (0.1)		817 (100.0)	266	1,083	159.11	9.40
悪性高血圧 (%)			2 (2.7)	2 (2.7)	1 (1.3)	11 (14.7)	7 (9.3)	17 (22.7)	15 (20.0)	14 (18.7)	5 (6.7)	1 (1.3)			75 (100.0)	32	107	162.55	9.40
糖尿病性腎症 (%)	4 (0.2)	1 (0.0)	9 (0.4)	61 (3.0)	112 (5.5)	228 (11.1)	260 (12.7)	443 (21.6)	410 (20.0)	334 (16.3)	146 (7.1)	32 (1.6)	6 (0.3)	2 (0.1)	2,048 (100.0)	718	2,766	162.54	9.89
SLE腎炎 (%)				1 (2.2)	4 (8.9)	8 (17.8)	11 (24.4)	9 (20.0)	8 (17.8)	4 (8.9)					45 (100.0)	17	62	158.73	7.61
アミロイド腎 (%)				1 (16.7)			2 (33.3)		1 (16.7)	1 (16.7)	1 (16.7)				6 (100.0)	3	9	161.33	11.72
痛風腎 (%)			1 (3.8)	1 (3.8)		2 (7.7)	3 (11.5)	5 (19.2)	5 (19.2)	7 (26.9)	2 (7.7)				26 (100.0)	7	33	163.88	9.61
先天性代謝異常による腎不全 (%)	2 (14.3)		1 (7.1)		2 (14.3)	1 (7.1)	5 (35.7)	2 (14.3)		1 (7.1)					14 (100.0)	4	18	147.64	23.08
腎・尿路結核 (%)							1 (100.0)								1 (100.0)		1	155.00	
腎・尿路結石 (%)					3 (25.0)	1 (8.3)	4 (33.3)	1 (8.3)	3 (25.0)						12 (100.0)	4	16	156.25	7.01
腎・尿路腫瘍 (%)			1 (8.3)	1 (8.3)	1 (8.3)		1 (8.3)	4 (33.3)	3 (25.0)	1 (8.3)					12 (100.0)	2	14	158.75	11.04
閉塞性尿路障害 (%)	2 (11.1)				1 (5.6)	4 (22.2)		3 (16.7)	4 (22.2)	3 (16.7)	1 (5.6)				18 (100.0)	4	22	155.06	23.77
骨髄腫 (%)			1 (16.7)		2 (33.3)			2 (33.3)	1 (16.7)						6 (100.0)	2	8	153.17	10.36
腎形成不全 (%)	18 (29.5)	1 (1.6)	3 (4.9)	4 (6.6)	5 (8.2)	7 (11.5)	6 (9.8)	5 (8.2)	2 (3.3)	8 (13.1)	1 (1.6)	1 (1.6)			61 (100.0)	15	76	136.90	34.26
不明 (%)	3 (0.5)	1 (0.2)	10 (1.6)	29 (4.7)	41 (6.6)	80 (12.9)	115 (18.6)	135 (21.8)	98 (15.9)	69 (11.2)	30 (4.9)	5 (0.8)	1 (0.2)	1 (0.2)	618 (100.0)	222	840	159.87	10.05
再導入 (%)	1 (2.4)	1 (2.4)		1 (2.4)	2 (4.9)	6 (14.6)	6 (14.6)	6 (14.6)	10 (24.4)	3 (7.3)	4 (9.8)	1 (2.4)			41 (100.0)	10	51	160.15	13.57
その他 (%)	13 (7.3)		5 (2.8)	6 (3.4)	13 (7.3)	26 (14.6)	21 (11.8)	25 (14.0)	31 (17.4)	23 (12.9)	13 (7.3)	1 (0.6)	1 (0.6)		178 (100.0)	71	249	155.36	22.33
合計 (%)	62 (0.9)	11 (0.2)	62 (0.9)	227 (3.4)	470 (7.1)	867 (13.0)	1,049 (15.7)	1,330 (20.0)	1,212 (18.2)	904 (13.6)	366 (5.5)	87 (1.3)	13 (0.2)	4 (0.1)	6,664 (100.0)	2,277	8,941	160.56	11.59
記載なし (%)																			
総計 (%)	62 (0.9)	11 (0.2)	62 (0.9)	227 (3.4)	470 (7.1)	867 (13.0)	1,049 (15.7)	1,330 (20.0)	1,212 (18.2)	904 (13.6)	366 (5.5)	87 (1.3)	13 (0.2)	4 (0.1)	6,664 (100.0)	2,277	8,941	160.56	11.59

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査