

表 2430 身長(cm) リン濃度(mg/dL)別 (腹膜透析患者)

リン濃度	130未満	130～	135～	140～	145～	150～	155～	160～	165～	170～	175～	180～	185～	190～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
3未満 (%)	1 (0.9)	1 (0.9)	3 (2.6)	3 (2.6)	16 (13.9)	17 (14.8)	16 (13.9)	22 (19.1)	16 (13.9)	13 (11.3)	3 (2.6)	3 (2.6)		1 (0.9)	115 (100.0)	11	126	158.42	14.46
3.0～ (%)	5 (2.0)		4 (1.6)	16 (6.4)	21 (8.4)	49 (19.7)	41 (16.5)	44 (17.7)	32 (12.9)	28 (11.2)	5 (2.0)	4 (1.6)			249 (100.0)	21	270	157.30	12.43
3.5～ (%)	3 (0.6)	1 (0.2)	5 (1.0)	24 (4.9)	28 (5.7)	72 (14.7)	88 (17.9)	97 (19.8)	82 (16.7)	58 (11.8)	29 (5.9)	3 (0.6)	1 (0.2)		491 (100.0)	34	525	160.08	10.66
4.0～ (%)	11 (1.5)	2 (0.3)	12 (1.6)	36 (4.8)	60 (8.1)	102 (13.7)	115 (15.5)	170 (22.9)	120 (16.2)	71 (9.6)	31 (4.2)	11 (1.5)	1 (0.1)	1 (0.1)	743 (100.0)	27	770	158.91	12.60
4.5～ (%)	5 (0.6)	3 (0.3)	7 (0.8)	39 (4.4)	69 (7.9)	121 (13.8)	145 (16.5)	163 (18.6)	156 (17.8)	112 (12.8)	45 (5.1)	8 (0.9)	3 (0.3)	1 (0.1)	877 (100.0)	44	921	160.20	10.61
5.0～ (%)	9 (1.0)		11 (1.2)	24 (2.7)	66 (7.4)	96 (10.7)	144 (16.1)	191 (21.3)	171 (19.1)	123 (13.7)	49 (5.5)	11 (1.2)			895 (100.0)	53	948	160.78	11.05
5.5～ (%)	4 (0.5)	2 (0.3)	8 (1.0)	20 (2.5)	51 (6.4)	100 (12.5)	139 (17.4)	156 (19.6)	149 (18.7)	108 (13.6)	42 (5.3)	15 (1.9)	2 (0.3)	1 (0.1)	797 (100.0)	42	839	161.20	10.73
6.0～ (%)	2 (1.5)		1 (0.8)	3 (2.3)	6 (4.5)	21 (15.9)	17 (12.9)	28 (21.2)	24 (18.2)	19 (14.4)	8 (6.1)	2 (1.5)	1 (0.8)		132 (100.0)	6	138	160.94	13.52
6.1～ (%)	5 (1.1)	1 (0.2)	1 (0.2)	12 (2.6)	28 (6.2)	61 (13.4)	65 (14.3)	81 (17.8)	87 (19.2)	72 (15.9)	35 (7.7)	6 (1.3)			454 (100.0)	23	477	161.35	12.60
6.5～ (%)	6 (1.6)		1 (0.3)	8 (2.2)	19 (5.1)	28 (7.5)	57 (15.3)	72 (19.4)	84 (22.6)	67 (18.0)	22 (5.9)	8 (2.2)			372 (100.0)	27	399	162.19	12.54
7.0～ (%)	3 (1.5)		3 (1.5)		13 (6.4)	20 (9.9)	25 (12.4)	51 (25.2)	36 (17.8)	35 (17.3)	11 (5.4)	4 (2.0)	1 (0.5)		202 (100.0)	10	212	161.66	12.90
7.5～ (%)	1 (0.7)			4 (2.9)	6 (4.3)	9 (6.5)	19 (13.8)	22 (15.9)	34 (24.6)	31 (22.5)	11 (8.0)	1 (0.7)			138 (100.0)	11	149	163.74	9.99
8.0～ (%)				1 (1.4)	3 (4.3)	5 (7.2)	12 (17.4)	15 (21.7)	12 (17.4)	14 (20.3)	6 (8.7)	1 (1.4)			69 (100.0)	2	71	164.12	8.44
8.5～ (%)	1 (2.9)			1 (2.9)	2 (5.9)	5 (14.7)	3 (8.8)	4 (11.8)	12 (35.3)	3 (8.8)	2 (5.9)		1 (2.9)		34 (100.0)	4	38	161.03	15.17
9.0～ (%)	1 (1.2)	1 (1.2)		1 (1.2)	2 (2.5)	10 (12.3)	9 (11.1)	14 (17.3)	11 (13.6)	22 (27.2)	8 (9.9)	2 (2.5)			81 (100.0)	8	89	163.59	10.63
合計 (%)	57 (1.0)	11 (0.2)	56 (1.0)	192 (3.4)	390 (6.9)	716 (12.7)	895 (15.8)	1,130 (20.0)	1,026 (18.2)	776 (13.7)	307 (5.4)	79 (1.4)	10 (0.2)	4 (0.1)	5,649 (100.0)	323	5,972	160.57	11.66
記載なし (%)	5 (0.5)		6 (0.6)	35 (3.4)	80 (7.9)	151 (14.9)	154 (15.2)	200 (19.7)	186 (18.3)	128 (12.6)	59 (5.8)	8 (0.8)	3 (0.3)		1,015 (100.0)	1,954	2,969	160.48	11.21
総計 (%)	62 (0.9)	11 (0.2)	62 (0.9)	227 (3.4)	470 (7.1)	867 (13.0)	1,049 (15.7)	1,330 (20.0)	1,212 (18.2)	904 (13.6)	366 (5.5)	87 (1.3)	13 (0.2)	4 (0.1)	6,664 (100.0)	2,277	8,941	160.56	11.59
平均	5.26	5.25	4.73	4.82	5.02	5.06	5.17	5.23	5.36	5.52	5.50	5.39	5.56	3.87	5.25	5.26	5.25		
標準偏差	1.50	2.69	1.10	1.16	1.23	1.35	1.27	1.29	1.30	1.46	1.41	1.48	1.42	2.01	1.34	1.53	1.35		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査