

表 2435 身長(cm) HDL-C濃度(mg/dL)別（腹膜透析患者）

HDL-C濃度	130未満	130～	135～	140～	145～	150～	155～	160～	165～	170～	175～	180～	185～	190～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)	2 (25.0)							1 (12.5)	2 (25.0)	2 (25.0)	1 (12.5)				8 (100.0)		8	150.75	35.07
20～ (%)	1 (0.4)		1 (0.4)	5 (1.8)	9 (3.3)	17 (6.3)	37 (13.7)	64 (23.6)	48 (17.7)	56 (20.7)	25 (9.2)	5 (1.8)	2 (0.7)	1 (0.4)	271 (100.0)	17	288	164.57	9.51
30～ (%)	1 (0.1)		11 (1.3)	34 (3.9)	59 (6.8)	77 (8.9)	121 (13.9)	169 (19.4)	173 (19.9)	146 (16.8)	59 (6.8)	17 (2.0)	2 (0.2)	1 (0.1)	870 (100.0)	63	933	162.27	10.08
40～ (%)	1 (0.1)		4 (0.4)	33 (3.5)	55 (5.9)	119 (12.7)	127 (13.6)	205 (21.9)	187 (20.0)	129 (13.8)	57 (6.1)	18 (1.9)	1 (0.1)		936 (100.0)	54	990	161.90	9.47
50～ (%)	3 (0.4)	3 (0.4)	6 (0.8)	28 (3.5)	55 (6.9)	114 (14.3)	131 (16.4)	167 (20.9)	150 (18.8)	90 (11.3)	40 (5.0)	11 (1.4)	1 (0.1)		799 (100.0)	40	839	160.45	10.05
60～ (%)	1 (0.2)		6 (1.2)	13 (2.6)	42 (8.5)	77 (15.5)	84 (16.9)	88 (17.7)	81 (16.3)	68 (13.7)	25 (5.0)	7 (1.4)	3 (0.6)	1 (0.2)	496 (100.0)	20	516	160.71	9.84
70～ (%)	1 (0.4)			8 (3.2)	28 (11.3)	44 (17.8)	62 (25.1)	43 (17.4)	28 (11.3)	24 (9.7)	8 (3.2)	1 (0.4)			247 (100.0)	12	259	158.47	9.27
80～ (%)			3 (2.2)	7 (5.2)	11 (8.2)	15 (11.2)	37 (27.6)	25 (18.7)	19 (14.2)	15 (11.2)	1 (0.7)	1 (0.7)			134 (100.0)	7	141	158.70	8.77
90～ (%)			1 (1.7)	4 (6.7)	4 (6.7)	9 (15.0)	13 (21.7)	7 (11.7)	9 (15.0)	8 (13.3)	4 (6.7)	1 (1.7)			60 (100.0)	1	61	159.88	9.93
100～ (%)			1 (1.9)	1 (1.9)	5 (9.3)	12 (22.2)	11 (20.4)	12 (22.2)	3 (5.6)	9 (16.7)					54 (100.0)	3	57	158.28	8.82
合計 (%)	10 (0.3)	3 (0.1)	33 (0.9)	133 (3.4)	268 (6.9)	484 (12.5)	623 (16.1)	781 (20.2)	700 (18.1)	547 (14.1)	220 (5.7)	61 (1.6)	9 (0.2)	3 (0.1)	3,875 (100.0)	217	4,092	161.28	9.96
記載なし (%)	52 (1.9)	8 (0.3)	29 (1.0)	94 (3.4)	202 (7.2)	383 (13.7)	426 (15.3)	549 (19.7)	512 (18.4)	357 (12.8)	146 (5.2)	26 (0.9)	4 (0.1)	1 (0.0)	2,789 (100.0)	2,060	4,849	159.54	13.48
総計 (%)	62 (0.9)	11 (0.2)	62 (0.9)	227 (3.4)	470 (7.1)	867 (13.0)	1,049 (15.7)	1,330 (20.0)	1,212 (18.2)	904 (13.6)	366 (5.5)	87 (1.3)	13 (0.2)	4 (0.1)	6,664 (100.0)	2,277	8,941	160.56	11.59
平均	42.90	57.67	53.15	51.10	54.06	54.51	54.10	49.58	48.29	48.30	45.46	46.16	47.11	40.33	50.59	48.43	50.47		
標準偏差	20.49	1.53	20.24	16.78	19.29	18.21	19.67	17.08	15.78	17.57	14.46	14.40	16.97	20.21	17.75	17.20	17.72		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査