

表 2436 身長(cm) Non-HDL-C濃度(mg/dL)別（腹膜透析患者）

Non-HDL-C濃度	130未満	130～	135～	140～	145～	150～	155～	160～	165～	170～	175～	180～	185～	190～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
50未満 (%)					1 (5.6)	2 (11.1)	5 (27.8)	4 (22.2)	2 (11.1)	2 (11.1)	1 (5.6)	1 (5.6)			18 (100.0)		18	162.61	9.67
50～ (%)				2 (1.8)	3 (2.7)	12 (10.9)	15 (13.6)	19 (17.3)	28 (25.5)	24 (21.8)	6 (5.5)	1 (0.9)			110 (100.0)	4	114	163.73	8.32
70～ (%)	1 (0.3)		3 (0.9)	7 (2.1)	17 (5.0)	31 (9.2)	49 (14.5)	64 (18.9)	76 (22.5)	63 (18.6)	22 (6.5)	4 (1.2)	1 (0.3)		338 (100.0)	13	351	163.02	9.23
90～ (%)			7 (1.1)	13 (2.0)	35 (5.5)	68 (10.7)	90 (14.2)	137 (21.6)	132 (20.8)	93 (14.6)	46 (7.2)	11 (1.7)	1 (0.2)	2 (0.3)	635 (100.0)	25	660	162.72	9.30
110～ (%)			4 (0.5)	33 (4.4)	51 (6.8)	95 (12.6)	124 (16.5)	156 (20.7)	119 (15.8)	97 (12.9)	52 (6.9)	15 (2.0)	7 (0.9)		753 (100.0)	44	797	161.44	9.78
130～ (%)	2 (0.3)	1 (0.2)	6 (1.0)	20 (3.2)	33 (5.2)	87 (13.8)	109 (17.3)	147 (23.4)	113 (18.0)	74 (11.8)	26 (4.1)	10 (1.6)		1 (0.2)	629 (100.0)	33	662	160.87	9.32
150～ (%)	4 (1.0)	1 (0.2)	6 (1.4)	16 (3.9)	43 (10.4)	55 (13.3)	63 (15.2)	73 (17.6)	69 (16.7)	58 (14.0)	24 (5.8)	2 (0.5)			414 (100.0)	22	436	159.59	11.59
170～ (%)			2 (0.8)	13 (5.3)	27 (11.0)	36 (14.7)	41 (16.7)	44 (18.0)	39 (15.9)	25 (10.2)	15 (6.1)	3 (1.2)			245 (100.0)	18	263	159.75	9.76
190～ (%)	1 (0.9)		1 (0.9)	3 (2.8)	8 (7.3)	19 (17.4)	24 (22.0)	18 (16.5)	21 (19.3)	9 (8.3)	2 (1.8)	3 (2.8)			109 (100.0)	11	120	159.38	11.17
210～ (%)	2 (2.5)	1 (1.2)		6 (7.4)	8 (9.9)	15 (18.5)	19 (23.5)	9 (11.1)	13 (16.0)	7 (8.6)	1 (1.2)				81 (100.0)	9	90	155.70	14.08
合計 (%)	10 (0.3)	3 (0.1)	29 (0.9)	113 (3.4)	226 (6.8)	420 (12.6)	539 (16.2)	671 (20.1)	612 (18.4)	452 (13.6)	195 (5.9)	50 (1.5)	9 (0.3)	3 (0.1)	3,332 (100.0)	179	3,511	161.26	10.03
記載なし (%)	52 (1.6)	8 (0.2)	33 (1.0)	114 (3.4)	244 (7.3)	447 (13.4)	510 (15.3)	659 (19.8)	600 (18.0)	452 (13.6)	171 (5.1)	37 (1.1)	4 (0.1)	1 (0.0)	3,332 (100.0)	2,098	5,430	159.86	12.93
総計 (%)	62 (0.9)	11 (0.2)	62 (0.9)	227 (3.4)	470 (7.1)	867 (13.0)	1,049 (15.7)	1,330 (20.0)	1,212 (18.2)	904 (13.6)	366 (5.5)	87 (1.3)	13 (0.2)	4 (0.1)	6,664 (100.0)	2,277	8,941	160.56	11.59
平均	169.00	208.67	129.28	138.49	137.37	132.99	131.48	125.78	124.56	122.03	121.24	124.26	109.22	107.67	127.98	137.60	128.47		
標準偏差	57.41	108.65	32.94	39.49	41.18	38.87	38.85	34.17	38.34	36.73	32.82	33.96	15.88	25.42	37.84	40.18	38.01		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査