

表 2437 身長(cm) 収縮期血圧(mmHg)別（腹膜透析患者）

収縮期血圧	130未満	130～	135～	140～	145～	150～	155～	160～	165～	170～	175～	180～	185～	190～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
60未満 (%)							1 (100.0)								1 (100.0)		1	156.00	
60～ (%)	1 (7.7)		1 (7.7)	1 (7.7)	1 (7.7)	4 (30.8)		3 (23.1)	1 (7.7)	1 (7.7)					13 (100.0)		13	149.62	22.01
80～ (%)	13 (11.1)		2 (1.7)	5 (4.3)	10 (8.5)	15 (12.8)	23 (19.7)	20 (17.1)	20 (17.1)	7 (6.0)		1 (0.9)		1 (0.9)	117 (100.0)	7	124	150.84	24.87
100～ (%)	29 (4.7)	3 (0.5)	5 (0.8)	25 (4.1)	48 (7.8)	89 (14.5)	105 (17.1)	116 (18.9)	102 (16.6)	65 (10.6)	20 (3.3)	7 (1.1)			614 (100.0)	27	641	156.70	17.02
120～ (%)	6 (0.4)	3 (0.2)	22 (1.5)	53 (3.6)	115 (7.8)	182 (12.4)	273 (18.6)	276 (18.8)	252 (17.2)	184 (12.6)	72 (4.9)	24 (1.6)	2 (0.1)	1 (0.1)	1,465 (100.0)	51	1,516	160.33	10.30
140～ (%)	2 (0.1)		7 (0.5)	40 (2.6)	94 (6.2)	189 (12.5)	217 (14.3)	322 (21.2)	290 (19.1)	241 (15.9)	86 (5.7)	20 (1.3)	7 (0.5)	2 (0.1)	1,517 (100.0)	62	1,579	162.11	9.25
160～ (%)			5 (0.7)	15 (2.2)	40 (5.7)	79 (11.3)	97 (13.9)	139 (19.9)	132 (18.9)	123 (17.6)	54 (7.7)	13 (1.9)			697 (100.0)	24	721	162.84	9.26
180～ (%)	1 (0.5)			11 (5.4)	10 (4.9)	25 (12.2)	19 (9.3)	42 (20.5)	44 (21.5)	32 (15.6)	16 (7.8)	4 (2.0)	1 (0.5)		205 (100.0)	12	217	162.44	10.73
200～ (%)						2 (6.5)	5 (16.1)	4 (12.9)	5 (16.1)	8 (25.8)	5 (16.1)				31 (100.0)		31	165.16	8.85
220～ (%)						2 (20.0)	3 (30.0)	2 (20.0)	2 (20.0)	1 (10.0)					10 (100.0)		10	158.60	8.41
合計 (%)	52 (1.1)	6 (0.1)	42 (0.9)	150 (3.2)	322 (6.9)	585 (12.5)	743 (15.9)	924 (19.8)	848 (18.2)	662 (14.2)	253 (5.4)	69 (1.5)	10 (0.2)	4 (0.1)	4,670 (100.0)	183	4,853	160.66	11.86
記載なし (%)	10 (0.5)	5 (0.3)	20 (1.0)	77 (3.9)	148 (7.4)	282 (14.1)	306 (15.3)	406 (20.4)	364 (18.3)	242 (12.1)	113 (5.7)	18 (0.9)	3 (0.2)		1,994 (100.0)	2,094	4,088	160.32	10.94
総計 (%)	62 (0.9)	11 (0.2)	62 (0.9)	227 (3.4)	470 (7.1)	867 (13.0)	1,049 (15.7)	1,330 (20.0)	1,212 (18.2)	904 (13.6)	366 (5.5)	87 (1.3)	13 (0.2)	4 (0.1)	6,664 (100.0)	2,277	8,941	160.56	11.59
平均	107.69	121.67	129.52	137.51	138.11	139.05	138.50	141.77	142.55	145.02	147.96	143.54	147.50	131.50	140.97	141.97	141.01		
標準偏差	18.39	8.50	20.62	24.08	22.95	22.51	22.43	22.35	22.54	22.53	21.58	20.32	19.43	29.17	22.87	23.20	22.88		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査