

表 2440 透析後体重(kg) 性別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

性別	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	49	40	2,718	25,911	53,127	37,516	15,147	5,418	1,974	694	273	178	143,045	3,988	147,033	59.58	12.18
(%)	(0.0)	(0.0)	(1.9)	(18.1)	(37.1)	(26.2)	(10.6)	(3.8)	(1.4)	(0.5)	(0.2)	(0.1)	(100.0)				
女性	35	762	16,399	33,898	18,982	6,566	2,037	663	221	61	26	11	79,661	2,277	81,938	48.01	10.62
(%)	(0.0)	(1.0)	(20.6)	(42.6)	(23.8)	(8.2)	(2.6)	(0.8)	(0.3)	(0.1)	(0.0)	(0.0)	(100.0)				
合計	84	802	19,117	59,809	72,109	44,082	17,184	6,081	2,195	755	299	189	222,706	6,265	228,971	55.45	12.90
(%)	(0.0)	(0.4)	(8.6)	(26.9)	(32.4)	(19.8)	(7.7)	(2.7)	(1.0)	(0.3)	(0.1)	(0.1)	(100.0)				
記載なし																	
(%)																	
総計	84	802	19,117	59,809	72,109	44,082	17,184	6,081	2,195	755	299	189	222,706	6,265	228,971	55.45	12.90
(%)	(0.0)	(0.4)	(8.6)	(26.9)	(32.4)	(19.8)	(7.7)	(2.7)	(1.0)	(0.3)	(0.1)	(0.1)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査