

表 2441 透析後体重(kg) 年齢(歳)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

年齢	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)		2 (16.7)	3 (25.0)	3 (25.0)	4 (33.3)								12 (100.0)		12	42.19	12.97
15歳～ (%)		13 (2.1)	72 (11.4)	165 (26.2)	190 (30.2)	106 (16.8)	37 (5.9)	26 (4.1)	10 (1.6)	7 (1.1)	3 (0.5)	1 (0.2)	630 (100.0)	27	657	55.26	15.62
30歳～ (%)		40 (0.4)	370 (3.9)	1,481 (15.5)	2,224 (23.3)	2,158 (22.6)	1,443 (15.1)	909 (9.5)	510 (5.3)	215 (2.3)	99 (1.0)	91 (1.0)	9,540 (100.0)	262	9,802	65.22	18.09
45歳～ (%)	18 (0.0)	60 (0.2)	1,253 (3.2)	5,904 (15.3)	10,174 (26.4)	10,118 (26.2)	6,166 (16.0)	2,945 (7.6)	1,229 (3.2)	428 (1.1)	173 (0.4)	90 (0.2)	38,558 (100.0)	1,027	39,585	63.07	14.95
60歳～ (%)	36 (0.0)	180 (0.2)	6,321 (6.2)	25,595 (25.2)	36,079 (35.5)	22,967 (22.6)	7,885 (7.8)	1,996 (2.0)	412 (0.4)	101 (0.1)	23 (0.0)	7 (0.0)	101,602 (100.0)	2,776	104,378	55.72	11.21
75歳～ (%)	29 (0.0)	418 (0.6)	9,936 (14.5)	25,018 (36.5)	22,687 (33.1)	8,593 (12.5)	1,637 (2.4)	204 (0.3)	34 (0.0)	4 (0.0)	1 (0.0)		68,561 (100.0)	2,071	70,632	50.02	9.71
90歳～ (%)	1 (0.0)	88 (2.3)	1,161 (30.7)	1,638 (43.3)	746 (19.7)	137 (3.6)	15 (0.4)	1 (0.0)					3,787 (100.0)	102	3,889	44.18	8.26
合計 (%)	84 (0.0)	801 (0.4)	19,116 (8.6)	59,804 (26.9)	72,104 (32.4)	44,079 (19.8)	17,183 (7.7)	6,081 (2.7)	2,195 (1.0)	755 (0.3)	299 (0.1)	189 (0.1)	222,690 (100.0)	6,265	228,955	55.45	12.90
不明 (%)		1 (6.3)	1 (6.3)	5 (31.3)	5 (31.3)	3 (18.8)	1 (6.3)						16 (100.0)		16	53.02	12.09
記載なし (%)																	
総計 (%)	84 (0.0)	802 (0.4)	19,117 (8.6)	59,809 (26.9)	72,109 (32.4)	44,082 (19.8)	17,184 (7.7)	6,081 (2.7)	2,195 (1.0)	755 (0.3)	299 (0.1)	189 (0.1)	222,706 (100.0)	6,265	228,971	55.45	12.90
平均	68.51	74.86	75.00	71.80	68.78	64.87	60.28	55.43	51.56	49.34	47.91	45.87	68.07	68.55	68.08		
標準偏差	10.97	15.60	11.77	11.52	11.23	11.18	10.99	10.40	9.55	8.86	8.62	7.06	12.32	12.45	12.32		

数値下のかつこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査