

表 2445 透析後体重(kg) 糖尿病の既往別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

糖尿病の既往	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
既往なし	32	503	11,183	30,681	31,750	16,822	5,507	1,646	538	176	83	52	98,973	1,485	100,458	53.11	11.97
(%)	(41.6)	(73.3)	(66.0)	(57.3)	(48.5)	(41.5)	(34.4)	(28.8)	(26.1)	(24.7)	(29.7)	(28.7)	(49.0)	(35.8)	(48.7)		
既往あり	45	183	5,766	22,833	33,699	23,712	10,517	4,068	1,527	537	196	129	103,212	2,664	105,876	58.09	13.40
(%)	(58.4)	(26.7)	(34.0)	(42.7)	(51.5)	(58.5)	(65.6)	(71.2)	(73.9)	(75.3)	(70.3)	(71.3)	(51.0)	(64.2)	(51.3)		
合計	77	686	16,949	53,514	65,449	40,534	16,024	5,714	2,065	713	279	181	202,185	4,149	206,334	55.66	12.96
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		
不明		1	25	68	54	34	7	7		1	1		198	32	230	52.78	13.58
記載なし	7	115	2,143	6,227	6,606	3,514	1,153	360	130	41	19	8	20,323	2,084	22,407	53.38	12.05
総計	84	802	19,117	59,809	72,109	44,082	17,184	6,081	2,195	755	299	189	222,706	6,265	228,971	55.45	12.90

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査