

表 2446 透析後体重(kg) 心筋梗塞の既往別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

心筋梗塞の既往	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
既往なし	56	611	14,668	45,198	53,605	32,674	12,874	4,548	1,682	561	230	150	166,857	2,290	169,147	55.38	12.96
(%)	(82.4)	(93.0)	(92.2)	(90.9)	(89.4)	(88.8)	(89.6)	(89.2)	(91.6)	(89.9)	(91.3)	(93.2)	(90.0)	(87.7)	(89.9)		
既往あり	12	46	1,233	4,521	6,371	4,127	1,499	550	155	63	22	11	18,610	322	18,932	56.38	12.45
(%)	(17.6)	(7.0)	(7.8)	(9.1)	(10.6)	(11.2)	(10.4)	(10.8)	(8.4)	(10.1)	(8.7)	(6.8)	(10.0)	(12.3)	(10.1)		
合計	68	657	15,901	49,719	59,976	36,801	14,373	5,098	1,837	624	252	161	185,467	2,612	188,079	55.48	12.91
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		
不明	1	5	66	190	190	129	48	17	4	2	1		653	73	726	54.34	12.84
記載なし	15	140	3,150	9,900	11,943	7,152	2,763	966	354	129	46	28	36,586	3,580	40,166	55.30	12.82
総計	84	802	19,117	59,809	72,109	44,082	17,184	6,081	2,195	755	299	189	222,706	6,265	228,971	55.45	12.90

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査