

表 2447 透析後体重(kg) 脳出血の既往別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

脳出血の既往	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
既往なし	64	590	14,546	45,905	55,878	34,511	13,608	4,858	1,751	602	246	157	172,716	2,370	175,086	55.62	12.97
(%)	(92.8)	(88.9)	(91.4)	(92.6)	(93.8)	(94.6)	(95.4)	(96.2)	(95.9)	(96.9)	(99.2)	(98.1)	(93.6)	(92.5)	(93.6)		
既往あり	5	74	1,374	3,655	3,719	1,989	655	192	74	19	2	3	11,761	193	11,954	52.90	11.92
(%)	(7.2)	(11.1)	(8.6)	(7.4)	(6.2)	(5.4)	(4.6)	(3.8)	(4.1)	(3.1)	(0.8)	(1.9)	(6.4)	(7.5)	(6.4)		
合計	69	664	15,920	49,560	59,597	36,500	14,263	5,050	1,825	621	248	160	184,477	2,563	187,040	55.44	12.92
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		
不明		4	57	202	206	125	45	10	5	1	1		656	68	724	53.89	12.11
記載なし	15	134	3,140	10,047	12,306	7,457	2,876	1,021	365	133	50	29	37,573	3,634	41,207	55.47	12.81
総計	84	802	19,117	59,809	72,109	44,082	17,184	6,081	2,195	755	299	189	222,706	6,265	228,971	55.45	12.90

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査