

表 2448 透析後体重(kg) 脳梗塞の既往別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

脳梗塞の既往	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
既往なし	49	493	12,679	40,129	48,774	30,665	12,305	4,493	1,658	570	231	153	152,199	2,166	154,365	55.82	13.11
(%)	(67.1)	(72.9)	(78.5)	(79.8)	(80.6)	(82.9)	(85.4)	(88.1)	(90.6)	(91.2)	(92.8)	(95.0)	(81.3)	(78.7)	(81.3)		
既往あり	24	183	3,479	10,173	11,771	6,307	2,108	607	172	55	18	8	34,905	587	35,492	53.68	11.79
(%)	(32.9)	(27.1)	(21.5)	(20.2)	(19.4)	(17.1)	(14.6)	(11.9)	(9.4)	(8.8)	(7.2)	(5.0)	(18.7)	(21.3)	(18.7)		
合計	73	676	16,158	50,302	60,545	36,972	14,413	5,100	1,830	625	249	161	187,104	2,753	189,857	55.42	12.90
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		
不明		4	65	212	251	140	42	14	8	1	1		738	62	800	54.29	12.00
記載なし	11	122	2,894	9,295	11,313	6,970	2,729	967	357	129	49	28	34,864	3,450	38,314	55.60	12.91
総計	84	802	19,117	59,809	72,109	44,082	17,184	6,081	2,195	755	299	189	222,706	6,265	228,971	55.45	12.90

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査