

表 2449 透析後体重(kg) 四肢切断の有無別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

四肢切断の有無	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
切断なし	68	635	15,444	48,278	58,066	35,455	13,827	4,840	1,735	588	235	147	179,318	2,809	182,127	55.41	12.86
(%)	(94.4)	(95.1)	(96.5)	(96.6)	(96.5)	(96.1)	(95.8)	(94.4)	(93.6)	(93.2)	(94.8)	(91.3)	(96.3)	(93.9)	(96.3)		
切断あり	4	33	557	1,697	2,112	1,428	601	286	119	43	13	14	6,907	182	7,089	57.03	14.30
(%)	(5.6)	(4.9)	(3.5)	(3.4)	(3.5)	(3.9)	(4.2)	(5.6)	(6.4)	(6.8)	(5.2)	(8.7)	(3.7)	(6.1)	(3.7)		
合計	72	668	16,001	49,975	60,178	36,883	14,428	5,126	1,854	631	248	161	186,225	2,991	189,216	55.47	12.92
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		
不明		1	20	65	94	51	20	3	1		1		256	4	260	54.80	11.54
記載なし	12	133	3,096	9,769	11,837	7,148	2,736	952	340	124	50	28	36,225	3,270	39,495	55.34	12.78
総計	84	802	19,117	59,809	72,109	44,082	17,184	6,081	2,195	755	299	189	222,706	6,265	228,971	55.45	12.90

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査