

表 2450 透析後体重(kg) 大腿骨頸部骨折の既往別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

大腿骨頸部骨折 の既往	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
既往なし	61	547	14,197	46,615	57,555	35,606	14,025	4,995	1,802	606	244	160	176,413	2,614	179,027	55.75	12.90
(%)	(88.4)	(82.3)	(88.7)	(94.0)	(96.6)	(97.7)	(98.4)	(98.9)	(98.8)	(97.9)	(98.8)	(100.0)	(95.6)	(94.6)	(95.6)		
既往あり	8	118	1,805	2,975	2,033	820	232	54	22	13	3		8,083	150	8,233	48.33	11.22
(%)	(11.6)	(17.7)	(11.3)	(6.0)	(3.4)	(2.3)	(1.6)	(1.1)	(1.2)	(2.1)	(1.2)		(4.4)	(5.4)	(4.4)		
合計	69	665	16,002	49,590	59,588	36,426	14,257	5,049	1,824	619	247	160	184,496	2,764	187,260	55.43	12.92
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		
不明		4	66	214	241	175	57	18	7	3	1		786	17	803	55.24	12.68
記載なし	15	133	3,049	10,005	12,280	7,481	2,870	1,014	364	133	51	29	37,424	3,484	40,908	55.53	12.79
総計	84	802	19,117	59,809	72,109	44,082	17,184	6,081	2,195	755	299	189	222,706	6,265	228,971	55.45	12.90

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査