

表 2451 透析後体重(kg) 大腿骨頸部骨折の既往別（施設血液透析患者 男性のみ 透析回数週3回）

大腿骨頸部骨折 の既往	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
既往なし	35	32	2,079	20,482	42,603	30,387	12,360	4,449	1,614	553	224	151	114,969	1,728	116,697	59.73	12.20
(%)	(89.7)	(94.1)	(92.2)	(95.3)	(97.0)	(98.0)	(98.5)	(98.9)	(98.7)	(97.7)	(98.7)	(100.0)	(97.1)	(96.4)	(97.1)		
既往あり	4	2	177	1,004	1,324	624	188	50	21	13	3		3,410	64	3,474	54.77	10.93
(%)	(10.3)	(5.9)	(7.8)	(4.7)	(3.0)	(2.0)	(1.5)	(1.1)	(1.3)	(2.3)	(1.3)		(2.9)	(3.6)	(2.9)		
合計	39	34	2,256	21,486	43,927	31,011	12,548	4,499	1,635	566	227	151	118,379	1,792	120,171	59.59	12.19
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		
不明			12	82	175	150	52	15	7	3	1		497	8	505	59.81	11.80
記載なし	10	6	450	4,343	9,025	6,355	2,547	904	332	125	45	27	24,169	2,188	26,357	59.57	12.12
総計	49	40	2,718	25,911	53,127	37,516	15,147	5,418	1,974	694	273	178	143,045	3,988	147,033	59.58	12.18

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査