

表 2452 透析後体重(kg) 大腿骨頸部骨折の既往別（施設血液透析患者 女性のみ 透析回数週3回）

大腿骨頸部骨折 の既往	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
既往なし	26	515	12,118	26,133	14,952	5,219	1,665	546	188	53	20	9	61,444	886	62,330	48.31	10.69
(%)	(86.7)	(81.6)	(88.2)	(93.0)	(95.5)	(96.4)	(97.4)	(99.3)	(99.5)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(92.9)	(91.2)	(92.9)		
既往あり	4	116	1,628	1,971	709	196	44	4	1				4,673	86	4,759	43.64	8.86
(%)	(13.3)	(18.4)	(11.8)	(7.0)	(4.5)	(3.6)	(2.6)	(0.7)	(0.5)				(7.1)	(8.8)	(7.1)		
合計	30	631	13,746	28,104	15,661	5,415	1,709	550	189	53	20	9	66,117	972	67,089	47.98	10.64
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		
不明		4	54	132	66	25	5	3					289	9	298	47.39	10.03
記載なし	5	127	2,599	5,662	3,255	1,126	323	110	32	8	6	2	13,255	1,296	14,551	48.18	10.52
総計	35	762	16,399	33,898	18,982	6,566	2,037	663	221	61	26	11	79,661	2,277	81,938	48.01	10.62

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査