

表 2453 透析後体重(kg) 降圧薬使用の有無別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

降圧薬使用の有無	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
なし	21	323	6,500	17,854	19,649	11,544	4,431	1,538	532	170	56	49	62,667	699	63,366	54.41	12.81
(%)	(28.0)	(47.4)	(39.2)	(34.3)	(31.3)	(30.1)	(29.6)	(28.9)	(27.8)	(26.1)	(21.8)	(30.8)	(32.4)	(30.5)	(32.3)		
あり	54	358	10,081	34,147	43,074	26,829	10,547	3,776	1,383	482	201	110	131,042	1,594	132,636	55.97	12.90
(%)	(72.0)	(52.6)	(60.8)	(65.7)	(68.7)	(69.9)	(70.4)	(71.1)	(72.2)	(73.9)	(78.2)	(69.2)	(67.6)	(69.5)	(67.7)		
合計	75	681	16,581	52,001	62,723	38,373	14,978	5,314	1,915	652	257	159	193,709	2,293	196,002	55.46	12.89
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		
不明	1	5	81	230	290	163	62	21	9	4	2	1	869	54	923	54.93	13.23
記載なし	8	116	2,455	7,578	9,096	5,546	2,144	746	271	99	40	29	28,128	3,918	32,046	55.34	12.91
総計	84	802	19,117	59,809	72,109	44,082	17,184	6,081	2,195	755	299	189	222,706	6,265	228,971	55.45	12.90

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査