

表 2454 透析後体重(kg) 喫煙の有無別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

喫煙の有無	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
現在吸っていない	56	621	14,662	43,663	49,345	28,805	10,716	3,685	1,251	432	178	101	153,515	1,760	155,275	54.61	12.62
(%)	(84.8)	(97.3)	(96.0)	(92.5)	(87.5)	(83.7)	(80.1)	(77.3)	(74.4)	(73.5)	(76.4)	(69.7)	(87.8)	(90.1)	(87.9)		
現在吸っている	10	17	604	3,555	7,023	5,600	2,665	1,080	431	156	55	44	21,240	193	21,433	60.81	13.57
(%)	(15.2)	(2.7)	(4.0)	(7.5)	(12.5)	(16.3)	(19.9)	(22.7)	(25.6)	(26.5)	(23.6)	(30.3)	(12.2)	(9.9)	(12.1)		
合計	66	638	15,266	47,218	56,368	34,405	13,381	4,765	1,682	588	233	145	174,755	1,953	176,708	55.37	12.90
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		
不明	4	30	925	3,078	4,088	2,625	1,046	375	160	52	18	8	12,409	598	13,007	56.39	12.95
記載なし	14	134	2,926	9,513	11,653	7,052	2,757	941	353	115	48	36	35,542	3,714	39,256	55.50	12.85
総計	84	802	19,117	59,809	72,109	44,082	17,184	6,081	2,195	755	299	189	222,706	6,265	228,971	55.45	12.90

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査