

表 2455 透析後体重(kg) 腹膜透析の経験別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

腹膜透析の経験	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
なし	61	634	15,103	47,173	56,504	34,478	13,476	4,759	1,705	602	225	147	174,867	3,438	178,305	55.40	12.90
(%)	(92.4)	(96.1)	(97.1)	(96.8)	(96.6)	(96.3)	(96.8)	(96.3)	(96.4)	(98.9)	(97.4)	(98.0)	(96.6)	(96.7)	(96.6)		
あり(年末時点でカテーテルあり)		3	71	236	259	198	65	23	4	1			860	27	887	55.17	11.97
(%)		(0.5)	(0.5)	(0.5)	(0.4)	(0.6)	(0.5)	(0.5)	(0.2)	(0.2)			(0.5)	(0.8)	(0.5)		
あり(年末時点でカテーテルなし)	5	23	387	1,316	1,743	1,131	383	160	60	6	6	3	5,223	92	5,315	55.92	12.58
(%)	(7.6)	(3.5)	(2.5)	(2.7)	(3.0)	(3.2)	(2.8)	(3.2)	(3.4)	(1.0)	(2.6)	(2.0)	(2.9)	(2.6)	(2.9)		
合計	66	660	15,561	48,725	58,506	35,807	13,924	4,942	1,769	609	231	150	180,950	3,557	184,507	55.42	12.89
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		
不明	3	4	94	207	233	98	36	18	6	2	1		702	23	725	52.83	12.70
記載なし	15	138	3,462	10,877	13,370	8,177	3,224	1,121	420	144	67	39	41,054	2,685	43,739	55.62	12.94
総計	84	802	19,117	59,809	72,109	44,082	17,184	6,081	2,195	755	299	189	222,706	6,265	228,971	55.45	12.90

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査