

表 2458 透析後体重(kg) 血流量(ml/分)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

血流量	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
100未満 (%)		1 (2.3)	9 (20.5)	14 (31.8)	13 (29.5)	2 (4.5)	2 (4.5)	3 (6.8)					44 (100.0)		44	50.40	13.91
100～ (%)		14 (2.0)	130 (18.2)	223 (31.1)	199 (27.8)	101 (14.1)	28 (3.9)	11 (1.5)	6 (0.8)	4 (0.6)			716 (100.0)	23	739	50.76	12.89
120～ (%)	1 (0.0)	65 (3.1)	496 (23.8)	710 (34.1)	478 (22.9)	216 (10.4)	77 (3.7)	25 (1.2)	9 (0.4)	5 (0.2)	3 (0.1)		2,085 (100.0)	63	2,148	48.29	12.57
140～ (%)	3 (0.0)	250 (1.4)	3,818 (21.8)	6,697 (38.2)	4,490 (25.6)	1,600 (9.1)	485 (2.8)	132 (0.8)	43 (0.2)	12 (0.1)	6 (0.0)	5 (0.0)	17,541 (100.0)	432	17,973	48.16	11.10
160～ (%)	3 (0.1)	54 (0.9)	1,224 (21.0)	2,316 (39.8)	1,488 (25.6)	551 (9.5)	138 (2.4)	37 (0.6)	6 (0.1)		1 (0.0)		5,818 (100.0)	83	5,901	48.10	10.36
180～ (%)	11 (0.0)	147 (0.5)	4,111 (13.8)	10,927 (36.6)	9,396 (31.4)	3,830 (12.8)	1,042 (3.5)	302 (1.0)	81 (0.3)	17 (0.1)	9 (0.0)	5 (0.0)	29,878 (100.0)	607	30,485	50.83	10.72
200～ (%)	50 (0.1)	225 (0.2)	7,425 (7.5)	28,422 (28.9)	34,701 (35.3)	18,987 (19.3)	5,987 (6.1)	1,748 (1.8)	557 (0.6)	160 (0.2)	57 (0.1)	31 (0.0)	98,350 (100.0)	2,140	100,490	54.47	11.42
220～ (%)	7 (0.0)	24 (0.1)	878 (3.0)	5,215 (17.9)	9,940 (34.2)	7,888 (27.1)	3,438 (11.8)	1,160 (4.0)	378 (1.3)	112 (0.4)	38 (0.1)	20 (0.1)	29,098 (100.0)	448	29,546	59.61	12.28
240～ (%)	6 (0.0)	10 (0.0)	609 (2.3)	3,539 (13.3)	8,066 (30.3)	7,687 (28.9)	3,976 (14.9)	1,679 (6.3)	671 (2.5)	254 (1.0)	89 (0.3)	58 (0.2)	26,644 (100.0)	416	27,060	62.71	13.75
260～ (%)			41 (1.6)	272 (10.8)	674 (26.7)	781 (31.0)	434 (17.2)	190 (7.5)	76 (3.0)	23 (0.9)	15 (0.6)	14 (0.6)	2,520 (100.0)	13	2,533	64.77	14.47
280～ (%)	2 (0.1)	1 (0.0)	24 (1.0)	187 (8.0)	600 (25.8)	639 (27.5)	483 (20.8)	237 (10.2)	95 (4.1)	38 (1.6)	12 (0.5)	9 (0.4)	2,327 (100.0)	10	2,337	66.86	14.63
300～ (%)	1 (0.0)	1 (0.0)	63 (1.5)	428 (10.1)	991 (23.5)	1,125 (26.7)	770 (18.3)	425 (10.1)	216 (5.1)	105 (2.5)	56 (1.3)	36 (0.9)	4,217 (100.0)	48	4,265	67.73	16.72
350～ (%)		2 (0.5)	14 (3.3)	40 (9.4)	107 (25.1)	84 (19.7)	79 (18.5)	45 (10.6)	27 (6.3)	13 (3.1)	7 (1.6)	8 (1.9)	426 (100.0)	3	429	68.71	19.46
400～ (%)		2 (0.3)	51 (8.5)	150 (24.9)	170 (28.2)	128 (21.2)	54 (9.0)	26 (4.3)	13 (2.2)	4 (0.7)	3 (0.5)	2 (0.3)	603 (100.0)	115	718	57.67	14.87
合計 (%)	84 (0.0)	796 (0.4)	18,893 (8.6)	59,140 (26.8)	71,313 (32.4)	43,619 (19.8)	16,993 (7.7)	6,020 (2.7)	2,178 (1.0)	747 (0.3)	296 (0.1)	188 (0.1)	220,267 (100.0)	4,401	224,668	55.45	12.90
記載なし (%)		6 (0.2)	224 (9.2)	669 (27.4)	796 (32.6)	463 (19.0)	191 (7.8)	61 (2.5)	17 (0.7)	8 (0.3)	3 (0.1)	1 (0.0)	2,439 (100.0)	1,864	4,303	54.87	12.50
総計 (%)	84 (0.0)	802 (0.4)	19,117 (8.6)	59,809 (26.9)	72,109 (32.4)	44,082 (19.8)	17,184 (7.7)	6,081 (2.7)	2,195 (1.0)	755 (0.3)	299 (0.1)	189 (0.1)	222,706 (100.0)	6,265	228,971	55.45	12.90
平均	202.02	172.50	184.54	195.02	205.08	214.28	222.90	229.95	236.07	242.12	247.56	252.82	204.91	206.50	204.94		
標準偏差	27.45	35.33	32.74	32.06	32.92	34.87	37.48	39.49	42.03	43.32	49.22	49.16	35.89	56.76	36.42		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査