

表 2466 透析後体重(kg) 体重減少率(%)別 (施設血液透析患者 男性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

体重減少率	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
1.0未満 (%)		1 (0.0)	99 (4.2)	585 (24.9)	877 (37.3)	549 (23.3)	175 (7.4)	50 (2.1)	6 (0.3)	7 (0.3)		3 (0.1)	2,352 (100.0)		2,352	56.38	11.18
1.0～ (%)			116 (2.8)	856 (20.5)	1,560 (37.4)	1,093 (26.2)	387 (9.3)	105 (2.5)	34 (0.8)	9 (0.2)	8 (0.2)		4,168 (100.0)		4,168	58.16	11.22
2.0～ (%)		3 (0.0)	218 (2.1)	1,812 (17.0)	3,926 (36.9)	2,936 (27.6)	1,136 (10.7)	393 (3.7)	126 (1.2)	44 (0.4)	17 (0.2)	20 (0.2)	10,631 (100.0)		10,631	59.71	11.99
3.0～ (%)		4 (0.0)	322 (1.5)	3,342 (15.1)	7,808 (35.3)	6,286 (28.4)	2,792 (12.6)	985 (4.5)	369 (1.7)	124 (0.6)	52 (0.2)	37 (0.2)	22,121 (100.0)		22,121	61.02	12.38
4.0～ (%)	1 (0.0)	1 (0.0)	401 (1.3)	4,570 (15.3)	10,657 (35.7)	8,545 (28.6)	3,542 (11.9)	1,319 (4.4)	520 (1.7)	187 (0.6)	68 (0.2)	46 (0.2)	29,857 (100.0)		29,857	60.94	12.36
5.0～ (%)			384 (1.7)	4,363 (18.9)	9,044 (39.1)	5,850 (25.3)	2,301 (10.0)	751 (3.2)	270 (1.2)	100 (0.4)	39 (0.2)	20 (0.1)	23,122 (100.0)		23,122	59.07	11.66
6.0～ (%)		1 (0.0)	294 (2.6)	2,732 (24.1)	4,620 (40.7)	2,459 (21.7)	844 (7.4)	258 (2.3)	94 (0.8)	25 (0.2)	10 (0.1)	3 (0.0)	11,340 (100.0)		11,340	56.83	10.91
7.0～ (%)		5 (0.1)	175 (4.3)	1,185 (29.0)	1,646 (40.3)	748 (18.3)	222 (5.4)	69 (1.7)	26 (0.6)	7 (0.2)	2 (0.0)		4,085 (100.0)		4,085	54.94	10.51
8.0～ (%)		1 (0.1)	68 (5.7)	395 (33.0)	459 (38.4)	195 (16.3)	59 (4.9)	8 (0.7)	7 (0.6)	2 (0.2)	2 (0.2)		1,196 (100.0)		1,196	53.59	10.28
9.0～ (%)	1 (0.2)	4 (0.6)	49 (7.4)	224 (33.7)	261 (39.3)	96 (14.5)	21 (3.2)	6 (0.9)	1 (0.2)	1 (0.2)			664 (100.0)		664	52.39	9.97
合計 (%)	2 (0.0)	20 (0.0)	2,126 (1.9)	20,064 (18.3)	40,858 (37.3)	28,757 (26.3)	11,479 (10.5)	3,944 (3.6)	1,453 (1.3)	506 (0.5)	198 (0.2)	129 (0.1)	109,536 (100.0)		109,536	59.46	12.02
記載なし (%)	31 (19.3)	7 (4.3)	13 (8.1)	41 (25.5)	41 (25.5)	15 (9.3)	5 (3.1)	6 (3.7)	2 (1.2)				161 (100.0)	2,818	2,979	43.73	20.53
総計 (%)	33 (0.0)	27 (0.0)	2,139 (1.9)	20,105 (18.3)	40,899 (37.3)	28,772 (26.2)	11,484 (10.5)	3,950 (3.6)	1,455 (1.3)	506 (0.5)	198 (0.2)	129 (0.1)	109,697 (100.0)	2,818	112,515	59.43	12.05
平均	7.54	6.12	4.72	4.71	4.56	4.38	4.33	4.32	4.38	4.36	4.30	4.01	4.50		4.50		
標準偏差	3.77	4.13	2.16	1.84	1.64	1.49	1.40	1.32	1.21	1.26	1.20	1.11	1.62		1.62		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査