

表 2472 透析後体重(kg) 透析前クレアチニン濃度(mg/dL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

透析前クレアチニン濃度	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2未満 (%)		5 (6.6)	23 (30.3)	21 (27.6)	12 (15.8)	10 (13.2)	3 (3.9)	1 (1.3)			1 (1.3)		76 (100.0)		76	47.13	15.41
2～ (%)	1 (0.1)	78 (4.8)	589 (35.9)	548 (33.4)	256 (15.6)	129 (7.9)	23 (1.4)	8 (0.5)	4 (0.2)	1 (0.1)	2 (0.1)		1,639 (100.0)	17	1,656	44.22	11.41
4～ (%)	4 (0.1)	232 (3.0)	2,498 (32.3)	2,985 (38.7)	1,390 (18.0)	430 (5.6)	128 (1.7)	37 (0.5)	10 (0.1)	5 (0.1)	1 (0.0)	2 (0.0)	7,722 (100.0)	73	7,795	44.79	10.36
6～ (%)	12 (0.1)	204 (0.9)	4,867 (20.4)	9,809 (41.1)	6,084 (25.5)	2,132 (8.9)	537 (2.3)	142 (0.6)	43 (0.2)	10 (0.0)	5 (0.0)	5 (0.0)	23,850 (100.0)	156	24,006	48.11	10.30
8～ (%)	19 (0.0)	95 (0.2)	4,896 (10.7)	16,519 (36.0)	15,374 (33.5)	6,473 (14.1)	1,834 (4.0)	507 (1.1)	153 (0.3)	29 (0.1)	19 (0.0)	10 (0.0)	45,928 (100.0)	187	46,115	51.86	10.67
10～ (%)	14 (0.0)	27 (0.1)	1,981 (4.1)	12,467 (26.1)	18,098 (37.9)	10,176 (21.3)	3,501 (7.3)	1,044 (2.2)	326 (0.7)	122 (0.3)	37 (0.1)	17 (0.0)	47,810 (100.0)	224	48,034	56.18	11.23
12～ (%)	9 (0.0)	6 (0.0)	356 (1.2)	4,062 (13.7)	10,563 (35.7)	8,848 (29.9)	3,789 (12.8)	1,246 (4.2)	483 (1.6)	149 (0.5)	52 (0.2)	38 (0.1)	29,601 (100.0)	153	29,754	61.21	11.96
14～ (%)	1 (0.0)	3 (0.0)	38 (0.3)	728 (6.1)	3,276 (27.3)	4,199 (35.0)	2,233 (18.6)	926 (7.7)	359 (3.0)	132 (1.1)	53 (0.4)	36 (0.3)	11,984 (100.0)	52	12,036	66.04	12.91
16～ (%)	1 (0.0)		8 (0.2)	110 (2.7)	733 (18.0)	1,388 (34.1)	926 (22.8)	510 (12.5)	231 (5.7)	88 (2.2)	44 (1.1)	29 (0.7)	4,068 (100.0)	32	4,100	70.84	14.25
合計 (%)	61 (0.0)	650 (0.4)	15,256 (8.8)	47,249 (27.4)	55,786 (32.3)	33,785 (19.6)	12,974 (7.5)	4,421 (2.6)	1,609 (0.9)	536 (0.3)	214 (0.1)	137 (0.1)	172,678 (100.0)	894	173,572	55.18	12.77
記載なし (%)	1 (0.1)	6 (0.6)	116 (11.4)	284 (27.9)	320 (31.5)	181 (17.8)	67 (6.6)	30 (2.9)	6 (0.6)	4 (0.4)	1 (0.1)	1 (0.1)	1,017 (100.0)	3,620	4,637	54.15	13.05
総計 (%)	62 (0.0)	656 (0.4)	15,372 (8.8)	47,533 (27.4)	56,106 (32.3)	33,966 (19.6)	13,041 (7.5)	4,451 (2.6)	1,615 (0.9)	540 (0.3)	215 (0.1)	138 (0.1)	173,695 (100.0)	4,514	178,209	55.17	12.78
平均	9.41	6.24	7.80	9.19	10.48	11.49	12.18	12.70	13.02	13.42	13.45	13.58	10.29	10.02	10.29		
標準偏差	2.72	2.16	2.23	2.30	2.43	2.59	2.67	2.81	2.75	2.93	3.41	3.04	2.78	3.24	2.79		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査