

表 2480 透析後体重(kg) nPCR(g/kg/day)別（施設血液透析患者 男性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上）

nPCR	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.4未満 (%)			16 (6.7)	64 (26.9)	94 (39.5)	41 (17.2)	18 (7.6)	1 (0.4)	3 (1.3)	1 (0.4)			238 (100.0)		238	55.03	11.13
0.4～ (%)		1 (0.0)	196 (3.6)	1,425 (26.1)	2,022 (37.1)	1,172 (21.5)	421 (7.7)	144 (2.6)	48 (0.9)	17 (0.3)	5 (0.1)	4 (0.1)	5,455 (100.0)		5,455	56.70	11.60
0.6～ (%)		4 (0.0)	643 (1.9)	6,384 (18.7)	12,525 (36.7)	9,014 (26.4)	3,687 (10.8)	1,182 (3.5)	438 (1.3)	158 (0.5)	54 (0.2)	44 (0.1)	34,133 (100.0)		34,133	59.47	12.02
0.8～ (%)	1 (0.0)	8 (0.0)	703 (1.6)	7,416 (16.5)	16,751 (37.2)	12,308 (27.4)	4,995 (11.1)	1,759 (3.9)	667 (1.5)	215 (0.5)	92 (0.2)	60 (0.1)	44,975 (100.0)		44,975	60.12	12.05
1.0～ (%)	1 (0.0)	5 (0.0)	310 (1.9)	2,986 (18.5)	6,135 (38.1)	4,218 (26.2)	1,546 (9.6)	594 (3.7)	195 (1.2)	75 (0.5)	24 (0.1)	13 (0.1)	16,102 (100.0)		16,102	59.19	11.81
1.2～ (%)		2 (0.1)	85 (3.5)	507 (20.9)	979 (40.3)	549 (22.6)	184 (7.6)	67 (2.8)	33 (1.4)	10 (0.4)	8 (0.3)	4 (0.2)	2,428 (100.0)		2,428	57.85	12.26
1.4～ (%)		1 (0.4)	9 (3.3)	56 (20.6)	106 (39.0)	60 (22.1)	25 (9.2)	8 (2.9)	4 (1.5)	1 (0.4)	1 (0.4)	1 (0.4)	272 (100.0)		272	57.89	13.44
1.6～ (%)				6 (17.6)	21 (61.8)	4 (11.8)	3 (8.8)						34 (100.0)		34	55.66	7.95
1.8～ (%)	1 (7.1)		3 (21.4)	2 (14.3)	5 (35.7)	2 (14.3)		1 (7.1)					14 (100.0)		14	50.14	15.97
2.0～ (%)	4 (14.3)	3 (10.7)	6 (21.4)	1 (3.6)	6 (21.4)	2 (7.1)	1 (3.6)	4 (14.3)	1 (3.6)				28 (100.0)		28	47.63	23.06
合計 (%)	7 (0.0)	24 (0.0)	1,971 (1.9)	18,847 (18.2)	38,644 (37.3)	27,370 (26.4)	10,880 (10.5)	3,760 (3.6)	1,389 (1.3)	477 (0.5)	184 (0.2)	126 (0.1)	103,679 (100.0)		103,679	59.51	12.02
記載なし (%)	26 (0.4)	3 (0.0)	168 (2.8)	1,258 (20.9)	2,255 (37.5)	1,402 (23.3)	604 (10.0)	190 (3.2)	66 (1.1)	29 (0.5)	14 (0.2)	3 (0.0)	6,018 (100.0)	2,818	8,836	58.18	12.45
総計 (%)	33 (0.0)	27 (0.0)	2,139 (1.9)	20,105 (18.3)	40,899 (37.3)	28,772 (26.2)	11,484 (10.5)	3,950 (3.6)	1,455 (1.3)	506 (0.5)	198 (0.2)	129 (0.1)	109,697 (100.0)	2,818	112,515	59.43	12.05
平均	1.87	1.15	0.84	0.84	0.85	0.85	0.85	0.86	0.86	0.85	0.88	0.85	0.85		0.85		
標準偏差	0.69	0.57	0.22	0.18	0.17	0.16	0.16	0.16	0.17	0.16	0.17	0.16	0.17		0.17		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査