

表 2481 透析後体重(kg) nPCR(g/kg/day)別（施設血液透析患者 女性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上）

nPCR	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.4未満 (%)		5 (3.8)	50 (38.2)	46 (35.1)	24 (18.3)	4 (3.1)	2 (1.5)						131 (100.0)		131	43.61	9.32
0.4～ (%)		50 (1.7)	793 (26.8)	1,198 (40.4)	611 (20.6)	202 (6.8)	79 (2.7)	20 (0.7)	7 (0.2)	3 (0.1)			2,963 (100.0)		2,963	46.57	10.80
0.6～ (%)		179 (1.1)	3,380 (20.1)	6,889 (40.9)	4,186 (24.9)	1,475 (8.8)	485 (2.9)	158 (0.9)	49 (0.3)	11 (0.1)	5 (0.0)	6 (0.0)	16,823 (100.0)		16,823	48.41	10.88
0.8～ (%)		218 (0.9)	4,874 (19.1)	10,954 (42.9)	6,339 (24.8)	2,237 (8.8)	628 (2.5)	195 (0.8)	67 (0.3)	14 (0.1)	8 (0.0)	2 (0.0)	25,536 (100.0)		25,536	48.33	10.39
1.0～ (%)	1 (0.0)	83 (0.7)	2,567 (21.1)	5,574 (45.9)	2,702 (22.2)	866 (7.1)	243 (2.0)	80 (0.7)	22 (0.2)	5 (0.0)	2 (0.0)	1 (0.0)	12,146 (100.0)		12,146	47.31	9.84
1.2～ (%)	1 (0.0)	31 (1.2)	635 (25.5)	1,118 (44.9)	513 (20.6)	137 (5.5)	37 (1.5)	7 (0.3)	6 (0.2)	1 (0.0)	2 (0.1)		2,488 (100.0)		2,488	46.05	9.60
1.4～ (%)		9 (3.2)	73 (25.8)	131 (46.3)	44 (15.5)	17 (6.0)	8 (2.8)	1 (0.4)					283 (100.0)		283	45.39	10.04
1.6～ (%)	1 (2.2)	1 (2.2)	22 (48.9)	14 (31.1)	3 (6.7)	1 (2.2)	1 (2.2)	2 (4.4)					45 (100.0)		45	42.98	13.27
1.8～ (%)			4 (36.4)	5 (45.5)			1 (9.1)		1 (9.1)				11 (100.0)		11	48.64	16.55
2.0～ (%)		1 (10.0)	2 (20.0)	3 (30.0)		2 (20.0)	1 (10.0)	1 (10.0)					10 (100.0)		10	51.28	19.23
合計 (%)	3 (0.0)	577 (1.0)	12,400 (20.5)	25,932 (42.9)	14,422 (23.9)	4,941 (8.2)	1,485 (2.5)	464 (0.8)	152 (0.3)	34 (0.1)	17 (0.0)	9 (0.0)	60,436 (100.0)		60,436	47.94	10.44
記載なし (%)	26 (0.7)	52 (1.5)	833 (23.4)	1,496 (42.0)	785 (22.0)	253 (7.1)	72 (2.0)	37 (1.0)	8 (0.2)				3,562 (100.0)	1,696	5,258	46.76	10.95
総計 (%)	29 (0.0)	629 (1.0)	13,233 (20.7)	27,428 (42.9)	15,207 (23.8)	5,194 (8.1)	1,557 (2.4)	501 (0.8)	160 (0.3)	34 (0.1)	17 (0.0)	9 (0.0)	63,998 (100.0)	1,696	65,694	47.87	10.47
平均	1.38	0.86	0.88	0.89	0.87	0.87	0.85	0.86	0.86	0.84	0.89	0.80	0.88		0.88		
標準偏差	0.33	0.22	0.20	0.18	0.17	0.17	0.18	0.18	0.18	0.17	0.19	0.12	0.18		0.18		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査