

表 2487 透析後体重(kg) 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

透析前補正 カルシウム濃度	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
7.0未満 (%)		3 (0.3)	79 (9.1)	226 (26.1)	260 (30.0)	164 (18.9)	86 (9.9)	28 (3.2)	10 (1.2)	6 (0.7)	3 (0.3)	2 (0.2)	867 (100.0)	7	874	56.36	14.30
7.0～ (%)		3 (0.2)	88 (7.0)	291 (23.2)	369 (29.4)	273 (21.7)	120 (9.6)	68 (5.4)	21 (1.7)	10 (0.8)	11 (0.9)	2 (0.2)	1,256 (100.0)	10	1,266	58.55	15.16
7.5～ (%)		13 (0.3)	354 (7.2)	1,134 (23.0)	1,543 (31.3)	1,075 (21.8)	480 (9.7)	195 (4.0)	76 (1.5)	36 (0.7)	13 (0.3)	7 (0.1)	4,926 (100.0)	45	4,971	57.64	13.95
8.0～ (%)	5 (0.0)	48 (0.3)	1,103 (6.8)	3,798 (23.5)	5,419 (33.5)	3,511 (21.7)	1,430 (8.8)	527 (3.3)	213 (1.3)	69 (0.4)	36 (0.2)	21 (0.1)	16,180 (100.0)	110	16,290	57.01	13.21
8.4～ (%)	3 (0.1)	14 (0.3)	361 (7.8)	1,106 (23.8)	1,561 (33.6)	993 (21.4)	374 (8.0)	159 (3.4)	48 (1.0)	19 (0.4)	3 (0.1)	8 (0.2)	4,649 (100.0)	27	4,676	56.42	13.17
8.5～ (%)	18 (0.0)	152 (0.3)	4,098 (7.6)	13,715 (25.6)	17,698 (33.0)	11,073 (20.7)	4,380 (8.2)	1,567 (2.9)	582 (1.1)	195 (0.4)	68 (0.1)	40 (0.1)	53,586 (100.0)	316	53,902	56.06	12.89
9.0～ (%)	19 (0.0)	218 (0.3)	5,342 (8.2)	17,518 (27.0)	21,216 (32.7)	12,767 (19.7)	5,069 (7.8)	1,747 (2.7)	618 (1.0)	217 (0.3)	74 (0.1)	55 (0.1)	64,860 (100.0)	376	65,236	55.49	12.79
9.5～ (%)	24 (0.1)	176 (0.4)	3,875 (9.2)	11,769 (27.9)	13,324 (31.6)	8,214 (19.5)	3,128 (7.4)	1,076 (2.6)	372 (0.9)	114 (0.3)	57 (0.1)	30 (0.1)	42,159 (100.0)	245	42,404	54.94	12.77
10.0～ (%)	2 (0.0)	28 (0.5)	535 (10.3)	1,441 (27.7)	1,666 (32.1)	976 (18.8)	360 (6.9)	115 (2.2)	35 (0.7)	26 (0.5)	6 (0.1)	7 (0.1)	5,197 (100.0)	30	5,227	54.54	12.96
10.1～ (%)	7 (0.1)	61 (0.5)	1,409 (10.7)	3,979 (30.2)	4,165 (31.6)	2,333 (17.7)	796 (6.0)	278 (2.1)	108 (0.8)	27 (0.2)	12 (0.1)	5 (0.0)	13,180 (100.0)	97	13,277	53.74	12.41
10.5～ (%)	3 (0.0)	32 (0.5)	756 (11.8)	1,971 (30.9)	1,983 (31.1)	1,073 (16.8)	372 (5.8)	133 (2.1)	37 (0.6)	15 (0.2)	5 (0.1)	6 (0.1)	6,386 (100.0)	67	6,453	53.27	12.48
11.0～ (%)		14 (0.7)	329 (15.4)	733 (34.3)	642 (30.1)	291 (13.6)	85 (4.0)	33 (1.5)	5 (0.2)	1 (0.0)	2 (0.1)		2,135 (100.0)	30	2,165	50.94	11.45
11.5～ (%)	1 (0.1)	6 (0.8)	103 (13.5)	272 (35.6)	231 (30.2)	100 (13.1)	34 (4.5)	12 (1.6)	3 (0.4)	1 (0.1)		1 (0.1)	764 (100.0)	5	769	51.10	11.74
12.0～ (%)		2 (0.4)	107 (20.0)	204 (38.2)	131 (24.5)	63 (11.8)	20 (3.7)	4 (0.7)	3 (0.6)				534 (100.0)	5	539	49.34	11.34
合計 (%)	82 (0.0)	770 (0.4)	18,539 (8.6)	58,157 (26.8)	70,208 (32.4)	42,906 (19.8)	16,734 (7.7)	5,942 (2.7)	2,131 (1.0)	736 (0.3)	290 (0.1)	184 (0.1)	216,679 (100.0)	1,370	218,049	55.46	12.90
記載なし (%)	2 (0.0)	32 (0.5)	578 (9.6)	1,652 (27.4)	1,901 (31.5)	1,176 (19.5)	450 (7.5)	139 (2.3)	64 (1.1)	19 (0.3)	9 (0.1)	5 (0.1)	6,027 (100.0)	4,895	10,922	54.91	12.89
総計 (%)	84 (0.0)	802 (0.4)	19,117 (8.6)	59,809 (26.9)	72,109 (32.4)	44,082 (19.8)	17,184 (7.7)	6,081 (2.7)	2,195 (1.0)	755 (0.3)	299 (0.1)	189 (0.1)	222,706 (100.0)	6,265	228,971	55.45	12.90
平均	9.33	9.34	9.30	9.24	9.17	9.14	9.10	9.08	9.05	9.00	8.97	9.01	9.18	9.23	9.18		
標準偏差	0.69	0.79	0.80	0.76	0.73	0.71	0.70	0.72	0.70	0.72	0.80	0.79	0.74	0.82	0.74		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査