

表 2498 透析後体重(kg) 性別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

性別	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	9	6	290	3,581	8,769	7,106	3,047	1,127	428	137	57	37	24,594	600	25,194	61.21	12.34
(%)	(0.0)	(0.0)	(1.2)	(14.6)	(35.7)	(28.9)	(12.4)	(4.6)	(1.7)	(0.6)	(0.2)	(0.2)	(100.0)				
女性	3	70	2,392	6,424	3,721	1,259	376	146	27	5	4		14,427	325	14,752	48.82	10.15
(%)	(0.0)	(0.5)	(16.6)	(44.5)	(25.8)	(8.7)	(2.6)	(1.0)	(0.2)	(0.0)	(0.0)		(100.0)				
合計	12	76	2,682	10,005	12,490	8,365	3,423	1,273	455	142	61	37	39,021	925	39,946	56.63	13.03
(%)	(0.0)	(0.2)	(6.9)	(25.6)	(32.0)	(21.4)	(8.8)	(3.3)	(1.2)	(0.4)	(0.2)	(0.1)	(100.0)				
記載なし																	
(%)																	
総計	12	76	2,682	10,005	12,490	8,365	3,423	1,273	455	142	61	37	39,021	925	39,946	56.63	13.03
(%)	(0.0)	(0.2)	(6.9)	(25.6)	(32.0)	(21.4)	(8.8)	(3.3)	(1.2)	(0.4)	(0.2)	(0.1)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査