

表 2499 透析後体重(kg) 年齢(歳)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

年齢	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)					1 (50.0)	1 (50.0)							2 (100.0)		2	63.85	6.58
15歳～ (%)		2 (1.3)	17 (10.9)	45 (28.8)	45 (28.8)	28 (17.9)	7 (4.5)	5 (3.2)	5 (3.2)	1 (0.6)	1 (0.6)		156 (100.0)	6	162	55.44	15.37
30歳～ (%)	1 (0.0)	10 (0.4)	73 (3.0)	410 (16.7)	613 (25.0)	540 (22.1)	385 (15.7)	224 (9.2)	107 (4.4)	50 (2.0)	22 (0.9)	13 (0.5)	2,448 (100.0)	40	2,488	64.51	17.12
45歳～ (%)	2 (0.0)	9 (0.1)	281 (3.1)	1,557 (17.4)	2,409 (26.9)	2,259 (25.2)	1,386 (15.5)	654 (7.3)	274 (3.1)	71 (0.8)	37 (0.4)	23 (0.3)	8,962 (100.0)	211	9,173	62.39	14.80
60歳～ (%)	5 (0.0)	20 (0.1)	1,152 (6.2)	4,749 (25.5)	6,476 (34.8)	4,347 (23.4)	1,402 (7.5)	360 (1.9)	65 (0.3)	20 (0.1)	1 (0.0)	1 (0.0)	18,598 (100.0)	416	19,014	55.72	11.09
75歳～ (%)	4 (0.0)	32 (0.4)	1,059 (12.4)	3,084 (36.2)	2,885 (33.9)	1,174 (13.8)	240 (2.8)	30 (0.4)	4 (0.0)				8,512 (100.0)	242	8,754	50.78	9.66
90歳～ (%)		3 (0.9)	100 (29.4)	158 (46.5)	61 (17.9)	15 (4.4)	3 (0.9)						340 (100.0)	10	350	44.63	8.56
合計 (%)	12 (0.0)	76 (0.2)	2,682 (6.9)	10,003 (25.6)	12,490 (32.0)	8,364 (21.4)	3,423 (8.8)	1,273 (3.3)	455 (1.2)	142 (0.4)	61 (0.2)	37 (0.1)	39,018 (100.0)	925	39,943	56.63	13.03
不明 (%)				2 (66.7)		1 (33.3)							3 (100.0)		3	51.23	10.20
記載なし (%)																	
総計 (%)	12 (0.0)	76 (0.2)	2,682 (6.9)	10,005 (25.6)	12,490 (32.0)	8,365 (21.4)	3,423 (8.8)	1,273 (3.3)	455 (1.2)	142 (0.4)	61 (0.2)	37 (0.1)	39,021 (100.0)	925	39,946	56.63	13.03
平均	66.17	69.12	71.42	68.28	65.97	62.87	58.52	54.06	50.55	48.70	47.03	45.59	64.94	66.31	64.98		
標準偏差	13.67	18.07	12.41	12.16	11.58	11.22	10.93	10.10	8.94	9.18	7.59	6.47	12.37	12.61	12.38		

数値下のかつこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査