

表 2505 透析後体重(kg) 脳出血の既往別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

脳出血の既往	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
既往なし	8	59	2,028	7,712	9,690	6,552	2,753	1,025	361	108	48	31	30,375	146	30,521	56.82	13.08
(%)	(88.9)	(92.2)	(92.3)	(93.4)	(94.2)	(94.7)	(96.1)	(95.7)	(96.5)	(94.7)	(92.3)	(96.9)	(94.2)	(88.5)	(94.2)		
既往あり	1	5	169	547	598	365	112	46	13	6	4	1	1,867	19	1,886	54.57	12.52
(%)	(11.1)	(7.8)	(7.7)	(6.6)	(5.8)	(5.3)	(3.9)	(4.3)	(3.5)	(5.3)	(7.7)	(3.1)	(5.8)	(11.5)	(5.8)		
合計	9	64	2,197	8,259	10,288	6,917	2,865	1,071	374	114	52	32	32,242	165	32,407	56.69	13.06
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		
不明		1	9	30	20	13	3	2					78	11	89	51.82	11.09
記載なし	3	11	476	1,716	2,182	1,435	555	200	81	28	9	5	6,701	749	7,450	56.38	12.90
総計	12	76	2,682	10,005	12,490	8,365	3,423	1,273	455	142	61	37	39,021	925	39,946	56.63	13.03

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査