

表 2506 透析後体重(kg) 脳梗塞の既往別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

脳梗塞の既往	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
既往なし	7	52	1,800	6,920	8,671	5,868	2,489	940	340	99	51	30	27,267	135	27,402	56.92	13.19
(%)	(77.8)	(83.9)	(80.4)	(82.7)	(82.7)	(83.7)	(86.2)	(87.2)	(89.5)	(87.6)	(98.1)	(93.8)	(83.4)	(75.4)	(83.3)		
既往あり	2	10	439	1,444	1,814	1,143	399	138	40	14	1	2	5,446	44	5,490	55.39	12.15
(%)	(22.2)	(16.1)	(19.6)	(17.3)	(17.3)	(16.3)	(13.8)	(12.8)	(10.5)	(12.4)	(1.9)	(6.3)	(16.6)	(24.6)	(16.7)		
合計	9	62	2,239	8,364	10,485	7,011	2,888	1,078	380	113	52	32	32,713	179	32,892	56.66	13.03
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		
不明		1	8	29	19	14	2						73	11	84	51.24	10.03
記載なし	3	13	435	1,612	1,986	1,340	533	195	75	29	9	5	6,235	735	6,970	56.49	13.05
総計	12	76	2,682	10,005	12,490	8,365	3,423	1,273	455	142	61	37	39,021	925	39,946	56.63	13.03

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査