

表 2507 透析後体重(kg) 四肢切断の有無別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

四肢切断の有無	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
切断なし	8	61	2,158	8,112	10,061	6,736	2,771	1,035	349	107	51	31	31,480	279	31,759	56.61	13.01
(%)	(100.0)	(96.8)	(96.8)	(97.2)	(96.6)	(96.4)	(95.8)	(94.9)	(91.8)	(92.2)	(98.1)	(96.9)	(96.5)	(93.6)	(96.5)		
切断あり		2	71	235	351	248	120	56	31	9	1	1	1,125	19	1,144	59.05	14.34
(%)		(3.2)	(3.2)	(2.8)	(3.4)	(3.6)	(4.2)	(5.1)	(8.2)	(7.8)	(1.9)	(3.1)	(3.5)	(6.4)	(3.5)		
合計	8	63	2,229	8,347	10,412	6,984	2,891	1,091	380	116	52	32	32,605	298	32,903	56.70	13.06
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		
不明			1	3	1	2		1					8	1	9	55.64	15.10
記載なし	4	13	452	1,655	2,077	1,379	532	181	75	26	9	5	6,408	626	7,034	56.28	12.87
総計	12	76	2,682	10,005	12,490	8,365	3,423	1,273	455	142	61	37	39,021	925	39,946	56.63	13.03

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査