

表 2508 透析後体重(kg) 大腿骨頸部骨折の既往別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

大腿骨頸部骨折 の既往	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
既往なし	8	58	1,995	7,804	9,951	6,751	2,821	1,059	371	112	52	32	31,014	164	31,178	56.94	13.07
(%)	(100.0)	(89.2)	(90.7)	(94.7)	(97.0)	(98.0)	(98.8)	(98.7)	(99.2)	(99.1)	(100.0)	(100.0)	(96.4)	(91.1)	(96.4)		
既往あり	7	204	435	308	137	35	14	3	1				1,144	16	1,160	49.79	11.09
(%)		(10.8)	(9.3)	(5.3)	(3.0)	(2.0)	(1.2)	(1.3)	(0.8)	(0.9)			(3.6)	(8.9)	(3.6)		
合計	8	65	2,199	8,239	10,259	6,888	2,856	1,073	374	113	52	32	32,158	180	32,338	56.69	13.07
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		
不明			8	8	10	7	2	1					36	3	39	52.57	12.66
記載なし	4	11	475	1,758	2,221	1,470	565	199	81	29	9	5	6,827	742	7,569	56.35	12.85
総計	12	76	2,682	10,005	12,490	8,365	3,423	1,273	455	142	61	37	39,021	925	39,946	56.63	13.03

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査