

表 2509 透析後体重(kg) 大腿骨頸部骨折の既往別（血液透析濾過患者 男性のみ 透析回数週3回）

大腿骨頸部骨折 の既往	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
既往なし (%)	5 (100.0)	5 (83.3)	209 (90.5)	2,832 (95.8)	7,049 (97.5)	5,750 (98.2)	2,510 (98.9)	938 (98.7)	348 (99.4)	110 (99.1)	49 (100.0)	32 (100.0)	19,837 (97.7)	106 (92.2)	19,943 (97.6)	61.40	12.37
既往あり (%)		1 (16.7)	22 (9.5)	124 (4.2)	182 (2.5)	104 (1.8)	29 (1.1)	12 (1.3)	2 (0.6)	1 (0.9)			477 (2.3)	9 (7.8)	486 (2.4)	55.99	10.82
合計 (%)	5 (100.0)	6 (100.0)	231 (100.0)	2,956 (100.0)	7,231 (100.0)	5,854 (100.0)	2,539 (100.0)	950 (100.0)	350 (100.0)	111 (100.0)	49 (100.0)	32 (100.0)	20,314 (100.0)	115 (100.0)	20,429 (100.0)	61.27	12.36
不明			2	2	7	6	2	1					20	1	21	58.67	11.81
記載なし	4		57	623	1,531	1,246	506	176	78	26	8	5	4,260	484	4,744	60.89	12.24
総計	9	6	290	3,581	8,769	7,106	3,047	1,127	428	137	57	37	24,594	600	25,194	61.21	12.34

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査