

表 2511 透析後体重(kg) 降圧薬使用の有無別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

降圧薬使用の有無	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
なし	5	31	880	3,263	3,684	2,392	935	337	106	34	15	8	11,690	58	11,748	55.71	12.73
(%)	(71.4)	(47.0)	(37.8)	(37.2)	(33.6)	(32.7)	(31.1)	(29.9)	(26.9)	(27.9)	(27.8)	(22.9)	(34.2)	(31.2)	(34.2)		
あり	2	35	1,450	5,499	7,275	4,926	2,071	791	288	88	39	27	22,491	128	22,619	57.17	13.16
(%)	(28.6)	(53.0)	(62.2)	(62.8)	(66.4)	(67.3)	(68.9)	(70.1)	(73.1)	(72.1)	(72.2)	(77.1)	(65.8)	(68.8)	(65.8)		
合計	7	66	2,330	8,762	10,959	7,318	3,006	1,128	394	122	54	35	34,181	186	34,367	56.67	13.03
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		
不明			8	15	25	13	3	6	1		1		72	24	96	56.80	15.30
記載なし	5	10	344	1,228	1,506	1,034	414	139	60	20	6	2	4,768	715	5,483	56.33	12.98
総計	12	76	2,682	10,005	12,490	8,365	3,423	1,273	455	142	61	37	39,021	925	39,946	56.63	13.03

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査