

表 2512 透析後体重(kg) 喫煙の有無別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

喫煙の有無	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
現在吸っていない	6	56	2,000	7,355	8,555	5,539	2,160	783	278	79	36	24	26,871	130	27,001	55.91	12.79
(%)	(85.7)	(90.3)	(95.1)	(92.3)	(86.8)	(83.8)	(79.2)	(76.5)	(75.5)	(74.5)	(73.5)	(75.0)	(86.9)	(92.9)	(86.9)		
現在吸っている	1	6	102	617	1,306	1,068	567	241	90	27	13	8	4,046	10	4,056	61.71	13.68
(%)	(14.3)	(9.7)	(4.9)	(7.7)	(13.2)	(16.2)	(20.8)	(23.5)	(24.5)	(25.5)	(26.5)	(25.0)	(13.1)	(7.1)	(13.1)		
合計	7	62	2,102	7,972	9,861	6,607	2,727	1,024	368	106	49	32	30,917	140	31,057	56.67	13.06
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		
不明	1	2	138	499	694	510	220	68	19	9	2	3	2,165	52	2,217	57.37	12.92
記載なし	4	12	442	1,534	1,935	1,248	476	181	68	27	10	2	5,939	733	6,672	56.15	12.91
総計	12	76	2,682	10,005	12,490	8,365	3,423	1,273	455	142	61	37	39,021	925	39,946	56.63	13.03

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査