

表 2513 透析後体重(kg) 腹膜透析の経験別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

腹膜透析の経験	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
なし	8	53	2,072	7,767	9,709	6,541	2,694	1,035	353	110	47	30	30,419	368	30,787	56.74	13.06
(%)	(100.0)	(93.0)	(95.3)	(95.3)	(95.0)	(95.1)	(95.4)	(96.6)	(95.9)	(96.5)	(97.9)	(96.8)	(95.2)	(95.6)	(95.3)		
あり(年末時点でカテーテルあり)		2	11	28	45	32	17	4	1		1		141	3	144	57.14	13.38
(%)		(3.5)	(0.5)	(0.3)	(0.4)	(0.5)	(0.6)	(0.4)	(0.3)		(2.1)		(0.4)	(0.8)	(0.4)		
あり(年末時点でカテーテルなし)		2	91	352	467	302	112	32	14	4		1	1,377	14	1,391	56.09	12.10
(%)		(3.5)	(4.2)	(4.3)	(4.6)	(4.4)	(4.0)	(3.0)	(3.8)	(3.5)		(3.2)	(4.3)	(3.6)	(4.3)		
合計	8	57	2,174	8,147	10,221	6,875	2,823	1,071	368	114	48	31	31,937	385	32,322	56.71	13.03
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		
不明	1		13	43	40	22	11	2	1	1			134	12	146	53.93	13.48
記載なし	3	19	495	1,815	2,229	1,468	589	200	86	27	13	6	6,950	528	7,478	56.30	13.04
総計	12	76	2,682	10,005	12,490	8,365	3,423	1,273	455	142	61	37	39,021	925	39,946	56.63	13.03

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査