

表 2516 透析後体重(kg) 血流量(ml/分)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

血流量	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
100未満 (%)			1 (100.0)										1 (100.0)		1	37.50	
100～ (%)		2 (5.4)	13 (35.1)	5 (13.5)	11 (29.7)	3 (8.1)	2 (5.4)	1 (2.7)					37 (100.0)		37	48.45	13.10
120～ (%)		2 (2.2)	26 (28.6)	32 (35.2)	22 (24.2)	7 (7.7)	2 (2.2)						91 (100.0)	3	94	46.21	10.32
140～ (%)		17 (1.3)	310 (23.4)	551 (41.6)	318 (24.0)	94 (7.1)	26 (2.0)	5 (0.4)	1 (0.1)	2 (0.2)	1 (0.1)		1,325 (100.0)	17	1,342	47.18	10.29
160～ (%)		6 (1.1)	155 (27.2)	220 (38.6)	133 (23.3)	43 (7.5)	12 (2.1)			1 (0.2)			570 (100.0)	8	578	46.77	9.95
180～ (%)		17 (0.6)	443 (15.3)	1,141 (39.5)	825 (28.6)	375 (13.0)	63 (2.2)	19 (0.7)	5 (0.2)		1 (0.0)		2,889 (100.0)	57	2,946	49.73	10.16
200～ (%)	5 (0.0)	22 (0.2)	1,121 (8.4)	4,341 (32.5)	4,553 (34.1)	2,257 (16.9)	761 (5.7)	205 (1.5)	55 (0.4)	15 (0.1)	7 (0.1)	2 (0.0)	13,344 (100.0)	203	13,547	53.52	11.13
220～ (%)		4 (0.1)	282 (4.3)	1,531 (23.4)	2,301 (35.1)	1,543 (23.5)	602 (9.2)	205 (3.1)	61 (0.9)	20 (0.3)	3 (0.0)	1 (0.0)	6,553 (100.0)	54	6,607	57.40	11.88
240～ (%)	7 (0.1)	4 (0.0)	233 (2.6)	1,562 (17.5)	2,873 (32.2)	2,476 (27.7)	1,096 (12.3)	445 (5.0)	158 (1.8)	50 (0.6)	19 (0.2)	11 (0.1)	8,934 (100.0)	193	9,127	60.52	13.01
260～ (%)			21 (1.9)	134 (12.4)	324 (30.1)	334 (31.0)	150 (13.9)	66 (6.1)	32 (3.0)	10 (0.9)	2 (0.2)	4 (0.4)	1,077 (100.0)	1	1,078	63.14	13.66
280～ (%)		1 (0.1)	19 (1.9)	119 (11.7)	293 (28.9)	300 (29.6)	177 (17.5)	64 (6.3)	29 (2.9)	6 (0.6)	2 (0.2)	3 (0.3)	1,013 (100.0)	7	1,020	63.53	13.63
300～ (%)		1 (0.0)	37 (1.5)	274 (11.2)	659 (26.9)	735 (30.0)	403 (16.4)	191 (7.8)	90 (3.7)	29 (1.2)	21 (0.9)	13 (0.5)	2,453 (100.0)	12	2,465	65.15	14.98
350～ (%)			2 (0.6)	25 (7.3)	69 (20.1)	101 (29.4)	74 (21.5)	43 (12.5)	19 (5.5)	7 (2.0)	3 (0.9)	1 (0.3)	344 (100.0)	1	345	69.26	14.91
400～ (%)			2 (1.0)	21 (10.5)	51 (25.5)	57 (28.5)	39 (19.5)	21 (10.5)	4 (2.0)	2 (1.0)	1 (0.5)	2 (1.0)	200 (100.0)	2	202	65.69	14.62
合計 (%)	12 (0.0)	76 (0.2)	2,665 (6.9)	9,956 (25.6)	12,432 (32.0)	8,325 (21.4)	3,407 (8.8)	1,265 (3.3)	454 (1.2)	142 (0.4)	60 (0.2)	37 (0.1)	38,831 (100.0)	558	39,389	56.63	13.03
記載なし (%)			17 (8.9)	49 (25.8)	58 (30.5)	40 (21.1)	16 (8.4)	8 (4.2)	1 (0.5)		1 (0.5)		190 (100.0)	367	557	56.03	13.07
総計 (%)	12 (0.0)	76 (0.2)	2,682 (6.9)	10,005 (25.6)	12,490 (32.0)	8,365 (21.4)	3,423 (8.8)	1,273 (3.3)	455 (1.2)	142 (0.4)	61 (0.2)	37 (0.1)	39,021 (100.0)	925	39,946	56.63	13.03
平均	229.17	182.63	197.10	210.81	223.35	235.17	244.17	252.58	259.04	259.40	268.42	280.81	224.24	219.64	224.18		
標準偏差	25.75	36.75	33.19	34.15	37.14	40.00	42.79	44.36	42.51	44.74	48.13	43.49	40.40	36.82	40.35		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査