

表 2517 透析後体重(kg) 身長(cm)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

身長	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
130未満 (%)		7 (18.9)	15 (40.5)	9 (24.3)	5 (13.5)	1 (2.7)							37 (100.0)	1	38	39.86	9.74
130～ (%)		7 (10.1)	44 (63.8)	9 (13.0)	8 (11.6)		1 (1.4)						69 (100.0)	1	70	38.31	8.46
135～ (%)		10 (3.5)	131 (46.1)	107 (37.7)	30 (10.6)	4 (1.4)	1 (0.4)	1 (0.4)					284 (100.0)	5	289	41.35	8.11
140～ (%)		17 (1.5)	414 (35.9)	527 (45.7)	155 (13.5)	33 (2.9)	6 (0.5)						1,152 (100.0)	11	1,163	43.14	7.80
145～ (%)		13 (0.4)	744 (25.0)	1,458 (49.0)	583 (19.6)	140 (4.7)	26 (0.9)	10 (0.3)	2 (0.1)	1 (0.0)			2,977 (100.0)	18	2,995	45.64	8.43
150～ (%)	3 (0.1)	8 (0.2)	715 (13.8)	2,525 (48.8)	1,406 (27.2)	418 (8.1)	74 (1.4)	23 (0.4)	6 (0.1)				5,178 (100.0)	34	5,212	48.55	8.76
155～ (%)	2 (0.0)	5 (0.1)	294 (4.9)	2,325 (38.6)	2,288 (38.0)	808 (13.4)	220 (3.7)	60 (1.0)	10 (0.2)	3 (0.0)	1 (0.0)	1 (0.0)	6,017 (100.0)	62	6,079	52.56	9.39
160～ (%)	1 (0.0)	3 (0.0)	105 (1.5)	1,555 (21.9)	3,115 (43.8)	1,689 (23.8)	490 (6.9)	116 (1.6)	27 (0.4)	4 (0.1)	2 (0.0)	1 (0.0)	7,108 (100.0)	69	7,177	56.87	9.58
165～ (%)	1 (0.0)	2 (0.0)	27 (0.4)	639 (9.6)	2,575 (38.7)	2,247 (33.7)	816 (12.3)	259 (3.9)	66 (1.0)	18 (0.3)	7 (0.1)	2 (0.0)	6,659 (100.0)	63	6,722	61.52	10.40
170～ (%)	4 (0.1)		4 (0.1)	177 (3.7)	1,262 (26.6)	1,767 (37.2)	959 (20.2)	367 (7.7)	136 (2.9)	42 (0.9)	19 (0.4)	9 (0.2)	4,746 (100.0)	39	4,785	66.58	12.00
175～ (%)			2 (0.1)	26 (1.5)	278 (15.7)	591 (33.4)	463 (26.1)	237 (13.4)	113 (6.4)	35 (2.0)	15 (0.8)	12 (0.7)	1,772 (100.0)	14	1,786	71.89	13.68
180～ (%)			2 (0.4)	5 (1.0)	34 (6.9)	127 (25.9)	145 (29.6)	90 (18.4)	49 (10.0)	24 (4.9)	9 (1.8)	5 (1.0)	490 (100.0)	3	493	77.18	15.12
185～ (%)					2 (2.6)	11 (14.3)	22 (28.6)	17 (22.1)	9 (11.7)	6 (7.8)	5 (6.5)	5 (6.5)	77 (100.0)		77	86.17	18.35
190～ (%)					1 (11.1)		3 (33.3)	2 (22.2)	2 (22.2)			1 (11.1)	9 (100.0)		9	89.22	27.65
合計 (%)	11 (0.0)	72 (0.2)	2,497 (6.8)	9,362 (25.6)	11,742 (32.1)	7,836 (21.4)	3,226 (8.8)	1,182 (3.2)	420 (1.1)	133 (0.4)	58 (0.2)	36 (0.1)	36,575 (100.0)	320	36,895	56.64	13.02
記載なし (%)	1 (0.0)	4 (0.2)	185 (7.6)	643 (26.3)	748 (30.6)	529 (21.6)	197 (8.1)	91 (3.7)	35 (1.4)	9 (0.4)	3 (0.1)	1 (0.0)	2,446 (100.0)	605	3,051	56.45	13.22
総計 (%)	12 (0.0)	76 (0.2)	2,682 (6.9)	10,005 (25.6)	12,490 (32.0)	8,365 (21.4)	3,423 (8.8)	1,273 (3.3)	455 (1.2)	142 (0.4)	61 (0.2)	37 (0.1)	39,021 (100.0)	925	39,946	56.63	13.03
平均	161.73	142.69	148.57	154.69	161.17	165.61	168.65	170.43	172.55	174.22	174.57	176.39	160.74	160.74	160.74		
標準偏差	8.95	10.67	7.03	7.32	7.65	7.19	7.20	7.32	6.84	6.69	6.64	7.48	9.54	9.58	9.54		

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査