

表 2523 透析後体重(kg) 体重減少率(%)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

体重減少率	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
1.0未満 (%)		3 (0.5)	54 (9.2)	164 (27.9)	190 (32.4)	119 (20.3)	39 (6.6)	13 (2.2)	3 (0.5)	1 (0.2)		1 (0.2)	587 (100.0)		587	54.49	12.22
1.0～ (%)		1 (0.1)	82 (7.5)	294 (26.9)	340 (31.2)	245 (22.5)	94 (8.6)	25 (2.3)	7 (0.6)		2 (0.2)	1 (0.1)	1,091 (100.0)		1,091	56.03	12.30
2.0～ (%)		6 (0.2)	150 (5.0)	697 (23.0)	1,029 (34.0)	726 (24.0)	267 (8.8)	104 (3.4)	34 (1.1)	10 (0.3)	4 (0.1)	3 (0.1)	3,030 (100.0)		3,030	57.52	12.57
3.0～ (%)		7 (0.1)	350 (5.1)	1,550 (22.5)	2,202 (31.9)	1,606 (23.3)	746 (10.8)	270 (3.9)	103 (1.5)	36 (0.5)	11 (0.2)	12 (0.2)	6,893 (100.0)		6,893	58.43	13.42
4.0～ (%)		10 (0.1)	493 (5.3)	2,159 (23.0)	3,080 (32.8)	2,175 (23.2)	908 (9.7)	354 (3.8)	125 (1.3)	41 (0.4)	23 (0.2)	9 (0.1)	9,377 (100.0)		9,377	57.94	13.05
5.0～ (%)		10 (0.1)	517 (7.0)	2,156 (29.0)	2,357 (31.7)	1,460 (19.7)	581 (7.8)	237 (3.2)	77 (1.0)	20 (0.3)	5 (0.1)	4 (0.1)	7,424 (100.0)		7,424	55.71	12.64
6.0～ (%)		14 (0.4)	392 (10.5)	1,205 (32.3)	1,185 (31.8)	638 (17.1)	220 (5.9)	51 (1.4)	18 (0.5)	1 (0.0)	1 (0.0)		3,725 (100.0)		3,725	52.93	11.30
7.0～ (%)		6 (0.4)	217 (15.4)	501 (35.6)	427 (30.3)	190 (13.5)	49 (3.5)	15 (1.1)	3 (0.2)				1,408 (100.0)		1,408	50.63	10.63
8.0～ (%)		2 (0.5)	88 (20.2)	154 (35.3)	134 (30.7)	52 (11.9)	4 (0.9)		1 (0.2)			1 (0.2)	436 (100.0)		436	48.98	10.08
9.0～ (%)		1 (0.5)	49 (25.8)	61 (32.1)	57 (30.0)	18 (9.5)	2 (1.1)	2 (1.1)					190 (100.0)		190	47.98	9.98
合計 (%)		60 (0.2)	2,392 (7.0)	8,941 (26.2)	11,001 (32.2)	7,229 (21.2)	2,910 (8.5)	1,071 (3.1)	371 (1.1)	109 (0.3)	46 (0.1)	31 (0.1)	34,161 (100.0)		34,161	56.38	12.85
記載なし (%)	11 (24.4)	7 (15.6)	4 (8.9)	12 (26.7)	7 (15.6)	2 (4.4)		2 (4.4)					45 (100.0)	765	810	35.68	20.44
総計 (%)	11 (0.0)	67 (0.2)	2,396 (7.0)	8,953 (26.2)	11,008 (32.2)	7,231 (21.1)	2,910 (8.5)	1,073 (3.1)	371 (1.1)	109 (0.3)	46 (0.1)	31 (0.1)	34,206 (100.0)	765	34,971	56.35	12.88
平均		5.06	5.10	4.78	4.57	4.41	4.31	4.29	4.28	4.20	4.18	4.01	4.59		4.59		
標準偏差		2.07	1.91	1.66	1.58	1.47	1.33	1.24	1.19	0.96	0.97	1.34	1.59		1.59		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査