

表 2524 透析後体重(kg) 体重減少率(%)別（血液透析濾過患者 男性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上）

体重減少率	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
1.0未満 (%)			6 (1.7)	63 (17.4)	138 (38.0)	102 (28.1)	37 (10.2)	12 (3.3)	3 (0.8)	1 (0.3)		1 (0.3)	363 (100.0)		363	59.37	11.28
1.0～ (%)			16 (2.4)	113 (17.3)	223 (34.0)	194 (29.6)	78 (11.9)	22 (3.4)	6 (0.9)		2 (0.3)	1 (0.2)	655 (100.0)		655	60.10	11.80
2.0～ (%)			17 (0.9)	246 (13.0)	675 (35.7)	601 (31.8)	226 (12.0)	79 (4.2)	31 (1.6)	9 (0.5)	2 (0.1)	3 (0.2)	1,889 (100.0)		1,889	61.38	11.66
3.0～ (%)			41 (1.0)	485 (11.3)	1,447 (33.6)	1,301 (30.2)	642 (14.9)	238 (5.5)	95 (2.2)	35 (0.8)	10 (0.2)	12 (0.3)	4,306 (100.0)		4,306	62.98	12.83
4.0～ (%)		1 (0.0)	45 (0.8)	728 (12.2)	2,076 (34.7)	1,822 (30.4)	815 (13.6)	314 (5.2)	118 (2.0)	40 (0.7)	22 (0.4)	9 (0.2)	5,990 (100.0)		5,990	62.39	12.42
5.0～ (%)		1 (0.0)	43 (0.9)	717 (15.6)	1,680 (36.6)	1,290 (28.1)	534 (11.6)	218 (4.8)	75 (1.6)	20 (0.4)	5 (0.1)	4 (0.1)	4,587 (100.0)		4,587	60.74	12.01
6.0～ (%)			41 (1.8)	448 (19.8)	912 (40.3)	588 (26.0)	208 (9.2)	48 (2.1)	18 (0.8)	1 (0.0)	1 (0.0)		2,265 (100.0)		2,265	57.92	10.31
7.0～ (%)		2 (0.2)	26 (3.1)	216 (25.7)	363 (43.2)	171 (20.4)	47 (5.6)	12 (1.4)	3 (0.4)				840 (100.0)		840	55.43	9.59
8.0～ (%)			10 (3.9)	79 (30.5)	115 (44.4)	49 (18.9)	4 (1.5)		1 (0.4)			1 (0.4)	259 (100.0)		259	53.80	9.17
9.0～ (%)			7 (6.5)	33 (30.8)	47 (43.9)	17 (15.9)	1 (0.9)	2 (1.9)					107 (100.0)		107	52.84	8.67
合計 (%)		4 (0.0)	252 (1.2)	3,128 (14.7)	7,676 (36.1)	6,135 (28.9)	2,592 (12.2)	945 (4.4)	350 (1.6)	106 (0.5)	42 (0.2)	31 (0.1)	21,261 (100.0)		21,261	61.04	12.14
記載なし (%)	8 (28.6)	2 (7.1)	2 (7.1)	5 (17.9)	7 (25.0)	2 (7.1)		2 (7.1)					28 (100.0)	487	515	38.91	23.58
総計 (%)	8 (0.0)	6 (0.0)	254 (1.2)	3,133 (14.7)	7,683 (36.1)	6,137 (28.8)	2,592 (12.2)	947 (4.4)	350 (1.6)	106 (0.5)	42 (0.2)	31 (0.1)	21,289 (100.0)	487	21,776	61.01	12.19
平均		6.40	4.99	4.88	4.66	4.46	4.35	4.33	4.31	4.22	4.27	4.01	4.58		4.58		
標準偏差		1.61	2.07	1.76	1.63	1.48	1.33	1.24	1.19	0.95	0.94	1.34	1.57		1.57		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査